AN. INST. BIOL. UNIV. NAL. AUTÓN. MÉXICO 50, SER. ZOOLOGÍA (1): 779-781, 1 fig. (1979)

ADICIONES A LOS LEPIDÓPTEROS MEXICANOS (FAMILIA ARCTIIDAE)

En trabajos anteriores, hemos registrado nuevos géneros y especies de Lepidópteros para la fauna mexicana. Como resultado de una serie de colectas nocturnas efectuadas en el estado de Chiapas, en la localidad de Agua Azul y Bonampak, obtuvimos ejemplares de especies registradas para Centro y Sudamérica, por lo que consideramos de interés el señalarlas por vez primera para México.

Como obras básicas de consulta, hemos utilizado la Biologia Centrali-Americana de Druce (1884-1885 y 1897), la obra de Seitz, Die Gross Schmetterlinge der Erde (1919-1925), así como el Catálogo de Hampson (1900-1901), actualizando la nomenclatura con los trabajos de Watson, 1971. An Illustrated Catalog of the Neotropic Arctiinae Types in the U.S. National Museum (Lepidoptera: Arctiidae) Part I, Part II (1973) y en 1975 en el Bull. British Museum (Natural History) Entomology. Supplement 25.

Todo el material estudiado se encuentra depositado en la Colección Entomológica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre el material estudiado, existen tres géneros nuevos para México: *Parathyris* Hübner, *Parevia* Hampson y *Viviennea* Watson, así como seis especies.

FAMILIA ARCTIIDAE
SUBFAMILIA ARCTIINAE

Idalus Walker.

I. hippia Cramer. Stoll. Suplem. Papil. Exot. Tab. 12 (1779) (Fig. 1).

Syn.: *I. albicollis* Walker, *I lemba* Druce.

Distribución conocida.—Según Seitz (*op. cit.*), p. 349, lám. 45 d, esta especie se encuentra desde Costa Rica y Panamá, hasta Brasil.

México.—Dos machos de Bonampak, Chiapas, colectados del 2 al 4 de mayo de 1978.

Otras especies del género *Idalus* registradas para México son: *I. alba* Druce y *A. rosea* (Schaus).

Neritos Walker.

N. tipolis Druce. Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (18): 39 (1896). (Fig. 2).

Distribución conocida.—Guatemala (Druce). Centroamérica a Colombia (Seitz, p. 361).

México.—Un macho de Bonampak, Chiapas, colectado entre el 2 y el 4 de mayo de 1978.

N. tipolis Druce, viene tratada en la Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 2: 367-368 e ilustrada en la lámina 73, fig. 27.

Otras especies de *Neritos* señaladas para México, son *N. cotes* Druce, *N. flavorosea* Walker y *N. samos* Druce.

Parevia Hampson.

P. parnelli Schaus. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 173 (1911) (Fig. 3).

Distribución conocida.—Seitz (*op. cit.*, p. 361, lám. 46 k) registra esta especie del Volcán Orosí en Costa Rica.

México.—Dos machos de Bonampak, Chiapas, colectados entre el 2 y el 4 de mayo de 1978.

Tanto el género como la especie constituyen nuevos registros para México, y deberá colocarse a continuación de *Neritos* Walker.

Viviennea Watson.

V. tegyra (Druce) Ann. Mag. Nat. Hist. 6(18): 36 (1896) (Fig. 4).

Syn.: *Automolis tegyra* Druce.

Distribución conocida.—Panamá (Druce), Belice, Costa Rica (Watson, 1975).

México.—Un macho de Agua Azul, Chiapas, del 1º de mayo de 1978, y cuatro más de Bonampak, Chiapas, colectados del 2 al 4 de mayo de 1978.

Watson en 1975 (*op. cit.*), describió el género *Viviennea*, y en él incluyó a la especie *tegyra* descrita por Druce como *Automolis*. Tanto el género como la especie constituyen nuevos registros para México y, deberá ubicarse a continuación de *Automolis* Hübner.

Parathyris Hübner (=*Thyrarctia* Hampson).

P. cedo-nulli (Cramer y Stoll). Papilio 4: 109, Lám. 346, Figs. A-B (1781) (Fig. 5).

Distribución conocida.—Según Seitz (*op. cit.*, p. 380), esta especie se distribuye en Bolivia, Guayanas, Perú y Brasil. Travassos (1949) Rev. Brasil. Biol. 9 (2): 179-186, publicó una revisión del género *Parathyris* y en ella hace un estudio detallado de *P. cedo-nulli* (Cramer y Stoll).

México.—Cuatro machos de Bonampak, Chiapas, colectados entre el 2 y el 4 de mayo de 1978.

Tanto el género como la especie, constituyen nuevos registros para México, y deberán ubicarse a continuación de *Epimolis* Dyar.

Phaeomolis Hampson.

P. lineatus (Druce). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1:89, Lám. 9, Fig. 17 (1884). (Fig. 6).

Syn.: *Evius lineatus* Druce.

Distribución conocida.—Panamá (Druce).

México.—Cinco machos de Bonampak, Chiapas, colectados entre el 2 y el 4 de mayo de 1978.

Otra especie del género *Phaeomolis* registrada para México es *P. cajali* Hoffmann, también de Chiapas.

Carlos R. Beutelspacher
Ma. Guadalupe López de Beutelspacher
Laboratorio de Entomología, Instituto de Biología, UNAM. México.



Fig. 1. *Idalus hippia* Cramer. Fig. 2. *Neritos tipolis* Druce. Fig. 3. *Parevia parnelli* Schaus. Fig. 4. *Viviennea tegyra* (Druce). Fig. 5. *Parathyris cedo-nulli* (Cramer y Stoll). Fig. 6. *Phaemolis lineatus* (Druce)