

CRUSTÁCEOS DECÁPODOS BENTÓNICOS DEL SUR DE SINALOA, MÉXICO

MICHEL E. HENDRICKX*

RESUMEN

Se presenta una lista de todas las especies de crustáceos decápodos conocidos hasta la fecha para el área geográfica correspondiente al sur del estado de Sinaloa, en el sureste del golfo de California, México. Esta lista incluye las especies recolectadas o citadas en la literatura para esta área, así como las especies no encontradas pero que incluyen el sur de Sinaloa en su área de distribución geográfica. La lista contiene 350 especies y 187 géneros incluidos en 53 familias. Comparativamente con la fauna del golfo de California, esto representa el 66% de las especies conocidas. Por grupos principales, tenemos los siguientes números de especies y porcentajes respecto a la fauna del Golfo: Penaeoidea, 19 (86%); Caridea, 61 (54%); Palinura, 4 (67%); Thalassinidea, 8 (57%); Anomura, 74 (69%); y Brachyura, 184 (68%).

Palabras clave: Crustacea, Decapoda, sur de Sinaloa, golfo de California, lista de especies.

ABSTRACT

A checklist of decapod crustaceans known for southern Sinaloa, southeastern Gulf of California, Mexico, is presented. The checklist includes all species collected or cited in the literature for this area as well as species not occurring there but for which southern Sinaloa is included in their geographical distribution. The checklist contains 350 species and 187 genera belonging to 53 families. Comparatively with the Gulf of California fauna, this accounts for 66% of all known species. Considering major groups, the following figures (number of species and % of Gulf of California species) were obtained: Penaeoidea, 19 (86%); Caridea, 61 (54%); Palinura, 4 (67%); Thalassinidea, 8 (57%); Anomura, 74 (69%); and Brachyura, 184 (68%).

Key words: Crustacea, Decapoda, southern Sinaloa, Gulf of California, checklist.

* Estación Mazatlán UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Apdo. Postal 811, Mazatlán 82000, Sinaloa, México.

INTRODUCCIÓN

El estudio de las comunidades de invertebrados marinos en las regiones tropicales y subtropicales del mundo se complica considerablemente por la alta diversidad de especies encontrada y las consecuentes dificultades en elucidar las relaciones que existen en estas comunidades. En un documento publicado recientemente en conjunto por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (UICN/PNUMA/WWF, 1991), se resalta la falta de información satisfactoria respecto al estado y la distribución de muchas especies vegetales y animales en países tropicales. El mismo documento (*op. cit.*: 45) recomienda, entre otras cosas, "realizar estudios e inventarios de especies de ecosistemas a nivel nacional, aprovechando plenamente los conocimientos tradicionales de las universidades, museos y autoridades de conservación de cada país". En años recientes, la investigación taxonómica y sistemática relacionada con los ambientes marinos tropicales ha incrementado de manera notable en calidad. Desafortunadamente, y casi al mismo tiempo, la planta de expertos asignados a museos o universidades de prestigio, tradicionalmente dedicados al estudio sistemático de los organismos marinos, no ha aumentado y en algunos casos ha disminuido en forma alarmante (Feldmann y Manning, 1992).

Desde 1978, en la Estación Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se inició un estudio integral de la fauna de macrocrustáceos bentónicos y pelágicos del Pacífico mexicano. Los resultados de este estudio fueron integrados, a manera de avances, en listas faunísticas preliminares, inventarios o publicaciones más específicos tratando pequeños grupos de especies (véanse Hendrickx, 1986; Hendrickx y Estrada-Navarrete, 1989; Hendrickx y Salgado-Barragán, 1991).

El conocimiento adquirido hasta la fecha permite presentar una lista actualizada de las especies de crustáceos decápodos bentónicos presentes en los sistemas costeros y en la plataforma continental del sur de Sinaloa, México, y puede ser considerada como la revisión del inventario preliminar producido en 1982 (véase van der Heiden y Hendrickx, 1982: 55). Este trabajo pretende contribuir a la elaboración de listas faunísticas regionales y posteriormente nacionales, con el doble propósito de: 1) proporcionar una fuente de información a la investigación en la región, y 2) evaluar la diversidad específica de los crustáceos decápodos bentónicos de la región.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde al sur de Sinaloa, México, tal como fue definida por van der Heiden y Hendrickx (1982), extendiéndose desde Teacapán (22° 30' N a los 105° 45' W) hasta Punta Piaxtla (22° 43' N a los 106° 48' W). El área costera se caracteriza por largas playas arenosas interrumpidas ocasionalmente por salientes rocosos, puntas, desembocaduras de ríos o bocas de lagunas costeras e incluye a la bahía de Mazatlán, el sistema de mayor diversidad faunística en la porción sureste

del golfo de California (Hendrickx, 1986). La plataforma continental está conformada principalmente por sedimentos blandos o mixtos, y se extiende, según la zona, entre aproximadamente 30 y 70 km mar adentro.

El sur de Sinaloa pertenece a la región zoogeográfica del Pacífico tropical este, que se extiende desde bahía Magdalena, en la costa oeste de Baja California Sur, hasta el norte del Perú, cerca de Paita (véanse Brusca y Wallerstein, 1979; Hendrickx, 1992). Forma parte del golfo de California, considerado por varios autores como una provincia zoogeográfica con un alto nivel de endemismo: la Provincia de Cortez (*sic.*) (véanse Garth, 1960; Rosenblatt, 1974; Vermeij, 1978; Brusca y Wallerstein, 1979; Brusca, 1980; Wicksten, 1983; Hendrickx, 1984; Corraca-Sandoval, 1991). Otros estudios recientes sobre macrocrustáccos bentónicos (crustáceos decápodos y estomatópodos) (Hendrickx y Salgado-Barragán, 1991; Hendrickx, 1992) indican que el nivel de endemismo para estos grupos quizás no es tan elevado como para justificar el tratamiento del golfo de California como una provincia zoogeográfica independiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de la lista faunística se tomaron en cuenta los antecedentes publicados por el autor (véase Hendrickx, 1986, 1992), los resultados de todos los muestreos realizados hasta 1991 por parte del Laboratorio de Invertebrados Bentónicos (LIB), Estación Mazatlán, UNAM, así como algunos trabajos de revisión publicados por colegas entre 1982 y 1990 (c. g. Villalobos *et al.*, 1989; Williams, 1986; Manning y Felder, 1991; Kim y Abele, 1988, 1989). El material del LIB que se utilizó proviene de muestreos diversos: 1) manuales y con pequeñas dragas de arrastre o de penetración, en lagunas costeras y playas en la zona entremareas, entre 1978 y 1989; 2) ocasionales, efectuados a bordo de camarones frente a las costas de Nayarit y del sur de Sinaloa; 3) con dragas y redes, en la bahía de Mazatlán (Proyecto BBMAZ) entre 1979 y 1981 y 4) con dragas y redes, durante tres campañas oceanográficas a bordo del B/O "El Puma" de la UNAM, abarcando la plataforma continental en el sur de Sinaloa.

La lista contiene todas las especies recolectadas en el área por el personal del LIB durante el estudio, o citadas como tales en la literatura científica y cuya identificación puede considerarse fidedigna. La mayoría de estas especies se recogieron durante los muestreos realizados en el sur de Sinaloa desde 1978 y el material fue incorporado a la Colección de Referencia del LIB. Además, la lista incluye las especies que han sido recolectadas a lo largo de la costa del Pacífico tropical mexicano y que responden a dos criterios: 1) por lo menos una colecta al norte del área de estudio, en la porción este del golfo de California (norte de Sinaloa hasta la desembocadura del río Colorado), y 2) por lo menos una colecta al sur del área de estudio, a lo largo de la costa o de la plataforma continental del Pacífico tropical este (con excepción de las islas oceánicas). En la lista, dichas especies se han marcado con un asterisco (hacemos notar que muchas de éstas se recolectaron en áreas distintas, durante otros

proyectos y se encuentran en las colecciones del LIB). Cabe recordar que sólo se incluyen especies marinas o asociadas con sistemas de aguas salobres; las especies de aguas dulces (e.g. *Atya*, *Macrobrachium*) no están incluidas, salvo cuando existe por lo menos una captura en aguas salobres. En cada familia, las especies se presentan por orden alfabético (géneros y especies).

RESULTADOS

La secuencia taxonómica general que se adoptó es la de Bowman y Abele (1982) con algunas modificaciones propuestas por Schram (1986). Sin embargo, importantes modificaciones recién propuestas por distinguidos taxónomos podrían alterar de manera substancial esta secuencia, en caso de que fueran adoptadas extensivamente por la comunidad científica internacional.

Caridea. De acuerdo con el análisis cladístico de Christoffersen (1989), la familia Pandalidae está constituida por grupos de géneros cuyas afinidades permiten distinguir a cinco o seis familias distintas, agrupadas dentro de la superfamilia Pandaloidea Haworth, 1825. El mismo autor, en un análisis filogenético de los carídeos en el cual considera 19 sinapomorfías en organismos adultos, propone una reestructuración de la clasificación de este importante grupo de crustáceos decápodos a nivel de superfamilias (Christoffersen, 1990). Por otra parte, en un trabajo más reciente aún, Chace (1992) propone una clasificación más tradicional de los Caridea. El optar por una u otra de estas dos propuestas de clasificación queda a criterio del lector.

Thalassinidea. La reciente revisión de los miembros de la familia Callianassidae (*s.l.*) de América por Manning y Felder (1991) ha permitido reestructurar el grupo y determinar de manera clara la posición taxonómica de las nueve especies descritas para el Pacífico este en cinco géneros (Callianassidae: *Neotrypaea*, *Callichirus*, *Corallianassa* y *Lepidophthalmus*; Ctenochelidae: *Callianopsis*). Sin embargo, es todavía demasiado temprano para poder establecer con claridad la distribución exacta de estas especies en la región.

Anomura. El uso del término Anomala (o Anomalia) para designar los Hippidea, Paguridea y Galatheidea, lo han discutido ampliamente McLaughlin y Holthuis (1985), quienes recomiendan conservar el nombre de Anomura MacLeay, por razones de estabilidad en la nomenclatura. Por otra parte, existe en la zona del Pacífico tropical este un número considerable de especies de ermitaños todavía no descritas o insuficientemente descritas (e. g. *Isocheles*, *Dardanus*, *Clibanarius*).

Brachyura. El ordenamiento de los Brachyura ha sido tema de controversias muy recientes, y no parece existir todavía un acuerdo en cuanto a las afinidades entre las distintas familias que forman parte de este grupo. En el caso específico de los cangrejos araña (Majidae), se siguió la secuencia taxonómica de Garth (1958) modificada de acuerdo con la propuesta de Drach y Guinot (1983) quienes incorporaron varios géneros del Pacífico americano en la familia Inachoididae Dana, 1851, dándole a las demás subfamilias de Majidae consideradas por Garth (*op. cit.*) el rango de familia (ver Hendrickx *et al.*, 1990). La subfamilia Tychinae Bell, 1835, co-

rresponde a los Ophtalmiinae Balss, 1929, de Garth (1958: 161) (véase: Williams *et al.*, 1977: 887). Los Xanthidae *sensu* Balss (1957), una familia de braquiuros sumamente diversificada en formas y especies, ha sido tema de varios intentos de reordenamientos taxonómicos. En el caso de un buen número de especies, las afinidades morfológicas que convierten a la estructuración de grupos de especies y posteriormente de grupos de géneros son bien claras. En otras, existe confusión. Es el caso, por ejemplo, de las especies que por sus rasgos morfológicos se encuentran en el límite entre los Xanthidae y los Gonopanopeidae (*sensu* Guinot, 1969: 244). Desde la publicación de los trabajos de Guinot (1977, 1978), ciertos autores adoptaron la postura de otorgar el rango de superfamilia a los Xanthidae (Xanthoidea), proporcionando de esta manera más libertad para dividir el grupo en categorías inferiores (véase: Serène, 1984; Martin y Abele, 1986). En el caso de la fauna del Pacífico mexicano, la división de los Xanthidae *s.l.* en varias familias (e.g. Xanthidae *s.s.*, Panopeidae; Trapeziidae; Pilumnidae; Carpiliidae; Menippidae) dejaría un buen número de especies sin poder clasificarse (e. g. especies de los géneros *Medaeus*, *Gonopanope*, *Microcassiope*, *Chacellus*, etc.), por lo cual se prefirió seguir una secuencia taxonómica más tradicional.

Suborden DENDROBRANCHIATA Bate, 1888
Superfamilia PENAEOIDEA Rafinesque, 1815

Familia PENAEIDAE Rafinesque, 1815

Género *Metapenaeopsis* Bouvier, 1905

**Metapenaeopsis beebei* (Burkenroad, 1938)

Género *Penaeus* Fabricius, 1798

Penaeus (Farfantepenaeus) brevirostris Kingsley, 1878

Penaeus (Farfantepenaeus) californiensis Holmes, 1900

Penaeus (Litopenaeus) stylirostris Stimpson, 1871

Penaeus (Litopenaeus) vannamei Boone, 1931

Género *Trachypenaeus* Alcock, 1901

Trachypenaeus brevisuturae Burkenroad, 1934

**Trachypenaeus faoae* Obarrio, 1954

Trachypenaeus pacificus Burkenroad, 1934

Género *Xiphopenaeus* Smith, 1886

Xiphopenaeus riveti Bouvier, 1907

Familia SICYONIIDAE Ortmann, 1898

Género *Sicyonia* A. Milne Edwards, 1830

Sicyonia aliasfinis (Burkenroad, 1934)

Sicyonia disdorsalis (Burkenroad, 1934)

Sicyonia disedwardsii (Burkenroad, 1934)

Sicyonia ingentis (Burkenroad, 1938)

Sicyonia laevigata Stimpson, 1871

Sicyonia martini Pérez-Farfante & Booth, 1981

**Sicyonia penicillata* Lockington, 1879

Sicyonia picta Faxon, 1893

Familia SOLENOCERIDAE Wood-Mason & Alcock, 1891

Género *Solenocera* Lucas, 1850

Solenocera florea Burkenroad, 1938

Solenocera mutator Burkenroad, 1938

Suborden PLEOCYEMATA Burkenroad, 1963

Infraorden CARIDEA Dana, 1852

Superfamilia ATYOIDEA de Haan, 1849

Familia PASIPHIAEIDAE Dana, 1852

Género *Leptocheila* Stimpson, 1860

Leptocheila serratorbita Bate, 1888

Superfamilia PALAEMONOIDEA Rafinesque, 1815

Familia GNATHOPHYLLIDAE Dana, 1852

Género *Gnathophyllum*, Latreille, 1819

Gnathophyllum panamense Faxon, 1893

Familia PALAEMONIDAE Rafinesque, 1815

Género *Brachycarpus*, Bate, 1888

Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1849)

Género *Macrobrachium* Bate, 1868

Macrobrachium tenellum (Smith, 1871)

Género *Neopontonides* Holthuis, 1951

Neopontonides dentiger Holthuis, 1951

Género *Palaemon* Weber, 1795

Palaemon (Palaemon) gracilis (Smith, 1871)

Palaemon (Palaemon) ritteri Holmes, 1895

Género *Palaemonella* Dana, 1852

- **Palaemonella holmesi* (Nobili, 1907)
 Género *Palaemonetes* Heller, 1869
Palaemonetes (Palaemonetes) hiltoni Schmitt, 1916
 Género *Periclimenes* Costa, 1844
Periclimenes infraspinis (Rathbun, 1902)
 **Periclimenes soror* Nobili, 1904
 Género *Pontonia* Latreille, 1829
Pontonia chimaera Holthuis, 1951
Pontonia margarita Smith, 1869
Pontonia pinnae Lockington, 1878
 Género *Veleronia* Holthuis, 1951
Veleronia laevifrons Holthuis, 1951
- Superfamilia ALPHEOIDEA Rafinesque, 1815
- Familia ALPHEIDAE Rafinesque, 1815
 Género *Alpheopsis* Coutière, 1896
Alpheopsis cortesiana Wicksten & Hendrickx, 1986
 Género *Alpheus* Fabricius, 1798
Alpheus armillatus H. Milne Edwards, 1837
 **Alpheus bellimanus* Lockington, 1877
 **Alpheus canalis* Kim & Abele, 1988
Alpheus cylindricus Kingsley, 1878
Alpheus floridanus Kingsley, 1878
 **Alpheus selgenhaueri* Kim & Abele, 1988
 **Alpheus grahami* Abele, 1975
 **Alpheus hebes* Kim & Abele, 1988
 **Alpheus hyeyoungae* Kim & Abele, 1988
Alpheus leviusculus Dana, 1852
Alpheus malleator Dana, 1852
Alpheus mazatlanicus Wicksten, 1983
 **Alpheus normanni* Kingsley, 1878
Alpheus schmitti Chace, 1972
 (? = *A. umbo* Kim & Abele, 1988)
Alpheus splendidus Coutière, 1897
Alpheus sulcatus Kingsley, 1878
 **Alpheus tenuis* Kim & Abele, 1988
 **Alpheus villus* Kim & Abele, 1988
 **Alpheus websteri* Kingsley, 1880
 Género *Automate* De Man, 1888
Automate dolichognatha de Man, 1938
Automate rugosa Coutière, 1900
 Género *Salmineus* Holthuis, 1955
Salmineus serratidigitus Coutière, 1896
 Género *Synalpheus* Bate, 1888
Synalpheus apiceros sanjosei Coutière, 1909
Synalpheus biunguiculatus (Stimpson, 1860)
Synalpheus digueti Coutière, 1909
Synalpheus lockingtoni Coutière, 1909
Synalpheus nobilii Coutière, 1909
- Familia IIIPOLYTIDAE Dana, 1852
 Género *Hippolyte* Leach, 1814
 **Hippolyte williamsi* Schmitt, 1924
 Género *Latreutes* Stimpson, 1860
- Latreutes antiborealis* Holthuis, 1952
 Género *Lysmata* Risso, 1816
Lysmata californica (Stimpson, 1866)
Lysmata galapagensis Schmitt, 1924
Lysmata intermedia (Kingsley, 1880)
 Género *Thor* Kingsley, 1878
Thor algicola Wicksten, 1987
 Género *Trachycaris* Calman, 1906
Trachycaris restrictus (A. Milne Edwards, 1878)
- Familia OGYRIDIDAE Hay & Shore, 1918
 Género *Ogyrides* Stebbing, 1914
Ogyrides alphaerostris (Kingsley, 1880)
- Familia PROCESSIDAE Ortmann, 1896
 Género *Processa* Leach, 1815
Processa peruviana Wicksten, 1983
 Género *Ambidexter* Manning & Chace, 1971
Ambidexter panamensis Abele, 1972
 **Ambidexter swifti* Abele, 1972
- Superfamilia PANDALOIDEA
- Familia PANDALIDAE Haworth, 1825
 Género *Pandalus* Leach, 1814
 **Pandalus amplius* (Bate, 1888)
 Género *Pantomus* A. Milne Edwards, 1883
Pantomus affinis Chace, 1937
 Género *Plesionika* Bate, 1888
 **Plesionika beebei* Chace, 1937
Plesionika mexicana Chace, 1937
 **Plesionika trispinus* Squires & Barragán, 1976
 Género *Heterocarpus* A. Milne Edwards, 1881
 **Heterocarpus affinis* Faxon, 1893
 **Heterocarpus vicarius* Faxon, 1893
- Infraorden PALINURA Latreille, 1803
- Familia SCYLLARIDAE Latreille, 1825
 Subfamilia Ibacinae Holthuis, 1985
 Género *Evibacus* Smith, 1869
Evibacus princeps Smith, 1866
- Familia PALINURIDAE Latreille, 1803
 Género *Panulirus* White, 1847
Panulirus gracilis Streets, 1871
Panulirus inflatus (Bouvier, 1895)
Panulirus penicillatus (Olivier, 1791)
- Infraorden TIALLASSINIDEA Latreille, 1831
- Familia AXIIDAE Huxley, 1879

- Género *Acanthaxius* Sakai & de Saint Laurent, 1989
 **Acanthaxius caespitosa* (Squires, 1979)
- Género *Axiopsis* Borradaile, 1903
 **Axiopsis baronai* Squires, 1976
- Género *Neaxius* Borradaile, 1903
 **Neaxius vivesi* (Bouvier, 1895)
- Familia CALLIANASSIDAE Dana, 1852
Callianassidae sp. A
Callianassidae sp. B
- Familia UPOGEBIIDAE Borradaile, 1903
 Género *Upogebia* Leach, 1814
Upogebia dawsoni Williams, 1986
 **Upogebia jonesi* Williams, 1986
Upogebia thistlei Williams, 1986
- Infraorden ANOMURA MacLeay, 1838
 Superfamilia HIPPOIDEA Latreille, 1825
- Familia ALBUNEIDAE Stimpson, 1858
 Género *Albunea* Weber, 1795
Albunea lucasia dc Saussure, 1835
- Género *Lepidopa* Stimpson, 1858
Lepidopa cf. deamae Benedict, 1903
Lepidopa sposa Efford, 1971
Lepidopa mearnsi Benedict, 1903
 **Lepidopa mexicana* Efford, 1971
- Familia HIPPIDAE Latreille, 1825
 Género *Hippa* Fabricius, 1787
Hippa strigillata (Stimpson, 1860)
- Género *Emerita* Scopoli, 1777
Emerita rathbunae Schmitt, 1935
- Superfamilia PAGUROIDEA Latreille, 1803
- Familia COENOBITIDAE Dana, 1851
 Género *Coenobita* Latreille, 1826
Coenobita compressus H. Milne Edwards, 1837
- Familia DIOGENIDAE Ortmann, 1892
 Género *Aniculus* Dana, 1852
Aniculus elegans Stimpson, 1859
- Género *Calcinus* Dana, 1852
Calcinus californiensis Bouvier, 1898
- Género *Clibanarius* Dana, 1852
Clibanarius albifiditus Nobili, 1901
Clibanarius digueti Bouvier, 1898
Clibanarius panamensis Stimpson, 1859
Clibanarius sp.
- Género *Dardanus* Paulson, 1875
Dardanus sinistripes (Stimpson, 1859)
- Género *Paguristes* Dana, 1852
- Paguristes anahuacus* Glassell, 1938
Paguristes bakeri Holmes, 1900
Paguristes digueti Bouvier, 1892
Paguristes praedator Glassell, 1937
Paguristes sp.*
- Género *Petrochirus* Stimpson, 1859
Petrochirus californiensis (Stimpson, 1859)
- Género *Trizopagurus* Forest, 1952
Trizopagurus magnificus (Bouvier, 1898)
- Familia PAGURIDAE Latreille, 1803
 Género *Iridopagurus* de Saint Laurent, 1966
 **Iridopagurus occidentalis* (Faxon, 1893)
- Género *Pagurus* Fabricius, 1775
 **Pagurus albus* (Benedict, 1892)
Pagurus annexus McLaughlin & Haig, 1993
Pagurus gladius (Benedict, 1892)
Pagurus smithi (Benedict, 1892)
Pagurus lepidus (Bouvier, 1898)
 **Pagurus vetaultae* Harvey & McLaughlin, 1991
- Género *Phimochirus* McLaughlin, 1981
 **Phimochirus californiensis* (Benedict, 1892)
- Género *Manucomplanus* McLaughlin, 1981
 **Manucomplanus varians* (Benedict, 1892)
- Género *Enallopagurus* McLaughlin, 1981
 **Enallopagurus affinis* (Faxon, 1893)
- Superfamilia GALATIIDEOIDEA Samouelle, 1819
- Familia GALATHEIDAE Samouelle, 1819
 Género *Pleuroncodes* Stimpson, 1860
Pleuroncodes planipes Stimpson, 1860
- Género *Munida* Leach, 1820
Munida mexicana (Benedict, 1903)
- Familia PORCELLANIDAE Haworth, 1825
 Género *Clastofoechus* Haig, 1960
Clastofoechus diffractus (Haig, 1957)
- Género *Euceramus* Stimpson, 1860
Euceramus panatelus Glassell, 1938
Euceramus transversilineatus (Lockington, 1878)
- Género *Heteroporellana* Haig, 1978
 **Heteroporellana corbicola* (Haig, 1960)
- Género *Megalobrachium* Stimpson, 1858
 **Megalobrachium erosum* (Glassell, 1936)
Megalobrachium festai (Nobili, 1901)
 **Megalobrachium garthi* Haig, 1957
Megalobrachium sinuimanus (Lockington, 1878)
 **Megalobrachium smithi* (Glassell, 1936)
 **Megalobrachium tuberculipes* (Lockington, 1878)
- Género *Minyocerus* Stimpson, 1858
Minyocerus kirki Glassell, 1938
- Género *Neopisosoma* Haig, 1960

- Neopisosoma dohenyi* Haig, 1960
Neopisosoma mexicanum (Streets, 1871)
- Género *Orthochela* Glassell, 1936
Orthochela pumila Glassell, 1936
- Género *Pachycheles* Stimpson, 1858
Pachycheles calculosus Haig, 1960
Pachycheles panamensis Faxon, 1893
Pachycheles setimanus (Lockington, 1878)
Pachycheles spinidactylus Haig, 1957
- Género *Petrolisthes* Stimpson, 1858
Petrolisthes agassizzi Faxon, 1893
Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850)
Petrolisthes crenulatus Lockington, 1878
Petrolisthes edwardsii (de Saussure, 1853)
Petrolisthes gracilis Stimpson, 1858
Petrolisthes haigae Chace, 1962
Petrolisthes hians Nobili, 1901
Petrolisthes hirtispinosus Lockington, 1878
Petrolisthes lewisi (Glassell, 1936)
Petrolisthes lindae Gore & Abele, 1973
Petrolisthes nobili Haig, 1960
Petrolisthes ortmanni Nobili, 1901
Petrolisthes polymitus Glassell, 1937
Petrolisthes robsonae Glassell, 1935
Petrolisthes sanselensis Glassell, 1936
Petrolisthes tonsorius Haig, 1960
- Género *Pisidia* Leach, 1820
Pisidia magdalenensis (Glassell, 1936)
- Género *Polyonyx* Stimpson, 1858
**Polyonyx nitidus* Lockington, 1878
Polyonyx quadrungulatus Glassell, 1935
- Género *Porcellana* Lamarck, 1801
Porcellana cancrisocialis Glassell, 1936
Porcellana hancocki Glassell, 1937
**Porcellana paguriconviva* Glassell, 1936
- Género *Ulloaia* Glassell, 1938
Ulloaia perpusilla Glassell, 1935
- Infraorden BRACHYURA Latreille, 1803
 Superfamilia DROMIOIDEA de Haan, 1833
- Familia DROMIIDAE de Haan, 1833
 Género *Dromidia* Stimpson, 1858
Dromidia larraburei Rathbun, 1910
- Género *Hypoconcha* Guérin, 1854
**Hypoconcha lowei* Rathbun, 1933
Hypoconcha panamensis Smith & Verrill, 1869
- Superfamilia RANINOIDEA de Haan, 1839
- Familia RANINIDAE de Haan, 1839
 Subfamilia Ranininae de Haan, 1839
 Género *Raninoides* H. Milne Edwards, 1837
Raninoides benedicti Rathbun, 1935
- Superfamilia DORIPPOIDEA MacLeay, 1838
 Familia DORIPPIDAE MacLeay, 1838
 Subfamilia Ethusinae Guinot, 1978
 Género *Ethusa* Roux, 1828
Ethusa panamensis Finnegan, 1931
Ethusa ciliatifrons Faxon, 1893
Ethusa lata Rathbun, 1893
- Superfamilia CALAPPOIDEA de Haan, 1833
- Familia CALAPPIDAE de Haan, 1833
 Subfamilia Calappinae de Haan, 1833
 Género *Calappa* Weber, 1795
Calappa convexa de Saussure, 1853
Calappa saussurei Rathbun, 1898
- Género Cycloes de Haan, 1837
Cycloes bairdi Stimpson, 1860
- Género Hepatella Smith, 1869
Hepatella amica Smith, 1869
- Género Hepatus Latreille, 1802
Hepatus kossmanni Neumann, 1878
- Género Mursia Leach, 1823
Mursia gaudichaudii H. Milne Edwards, 1837
- Género Osachila Stimpson, 1871
Osachila acuta Stimpson, 1871
Osachila lata Faxon, 1893
Osachila levis Rathbun, 1898
- Superfamilia LEUCOSIOIDEA Samouelle, 1819
- Familia LEUCOSIIDAE Samouelle, 1819
 Subfamilia Ebaliinae Stimpson, 1871
 Género *Ebalia* Leach, 1817
Ebalia cristata Rathbun, 1898
**Ebalia magdalenensis* Rathbun, 1933
- Género Lithadia Bell, 1855
Lithadia cumingii Bell, 1855
- Género Speloeophorus A. Milne Edwards, 1865
**Speloeophorus digueti* (Bouvier, 1898)
- Subfamilia Leucosiinae Samouelle, 1819
 Género *Iliacantha* Stimpson, 1871
Iliacantha hancocki Rathbun, 1935
Iliacantha schmitti Rathbun, 1935
- Subfamilia Iliinae Stimpson, 1871
 Género *Leucosilia* Bell, 1855
Leucosilia jurinei (de Saussure, 1853)
- Género Persephona Leach, 1817
Persephona edwardsii Bell, 1855
Persephona subovata (Rathbun, 1893)
Persephona townsendi (Rathbun, 1893)
- Género *Randallia* Stimpson, 1857
Randallia agaricaria Rathbun, 1898
Randallia americana (Rathbun, 1893)
Randallia bulligera Rathbun, 1898

Superfamilia MAJOIDEA Samouelle, 1819

Familia INACIIIDAE MacLeay, 1838

Género *Eriileptus* Rathbun, 1893*Eriileptus spinosus* Rathbun, 1893Género *Eucinetops* Stimpson, 1860*Eucinetops lucasi* Stimpson, 1860**Eucinetops panamensis* Rathbun, 1923*Eucinetops rubellula* Rathbun, 1923Género *Podochela* Stimpson, 1860**Podochela hemphilli* (Lockington, 1877)*Podochela latimanus* (Rathbun, 1893)*Podochela veleronis* Garth, 1958**Podochela vestita* (Stimpson, 1871)Género *Stenorynchus* Lamarck, 1818*Stenorhynchus debilis* (Smith, 1871)

Familia INACIIOIDAE Dana, 1851

Género *Collodes* Stimpson, 1860*Collodes gibbosus* (Bell, 1835)*Collodes granosus* Stimpson, 1860*Collodes tenuirostris* Rathbun, 1893Género *Euprognatha* Stimpson, 1871*Euprognatha bifida* Rathbun, 1893Género *Inachoides* H. Milne Edwards & Lucas,

1842

Inachoides laevis Stimpson, 1860Género *Paradasysgyius* Garth, 1958*Paradasysgyius depressus* (Bell, 1835)Género *Pyromata* Stimpson, 1871*Pyromata tuberculata* (Lockington, 1877)

Familia TYCIIIDAE Dana, 1851

Género *Pitho* Bell, 1835*Pitho picteti* (de Saussure, 1853)*Pitho sexdentata* Bell, 1835

Familia EPIALTIDAe MacLeay, 1838

Género *Acanthonyx* Latreille, 1825*Acanthonyx petiveri* H. Milne Edwards, 1834Género *Epialtus* H. Milne Edwards, 1834*Epialtus minimus* Lockington, 1877*Epialtus sulcirostris* Stimpson, 1860Género *Eupleurodon* Stimpson, 1871**Eupleurodon peruvianus* (Rathbun, 1923)*Eupleurodon trifurcatus* Stimpson, 1871

Familia PISIDAE Dana, 1851

Género *Herbstia* H. Milne Edwards, 1834*Herbstia campyloacantha* (Stimpson, 1860)*Herbstia tumida* (Stimpson, 1871)Género *Neodoclea* Buitendijk, 1950*Neodoclea boneti* Buitendijk, 1950Género *Notolopas* Stimpson, 1871*Notolopas lamellatus* Stimpson, 1871*Notolopas mexicanus* Garth, 1940Género *Pelia* Bell, 1835*Pelia pacifica* A. Milne Edwards, 1875*Pelia tumida* (Lockington, 1877)

Familia MAJIDAE Samouelle, 1819

Género *Maiopsis* Faxon, 1893*Maiopsis panamensis* Faxon, 1893

Familia MITIIRACIDAE MacLeay, 1838

Género *Ala* Lockington, 1877*Ala cornuta* (Stimpson, 1860)Género *Hemus* A. Milne Edwards, 1875*Hemus finneganae* Garth, 1958*Hemus* sp.Género *Microphrys* Milne Edwards, 1851**Microphrys branchialis* Rathbun, 1898*Microphrys platysoma* (Stimpson, 1860)Género *Mithrax* Desmarest, 1823*Mithrax (Mithraculus) denticulatus* Bell, 1835*Mithrax (Mithrax) armatus* de Saussure, 1853*Mithrax (Mithrax) spinipes* (Bell, 1835)*Mithrax (Mithrax) tuberculatus* Stimpson, 1860Género *Stenocionops* Desmarest, 1823*Stenocionops ovata* (Bell, 1835)Género *Teleophrys* Stimpson, 1860*Teleophrys cristulipes* Stimpson, 1860Género *Thoe* Bell, 1835*Thoe sulcata* *sulcata* Stimpson, 1860

Superfamilia PARTIENOPOIDEA MacLeay, 1815

Familia PARTIENOPIDAE MacLeay, 1838

Género *Cryptopodia* H. Milne Edwards, 1834**Cryptopodia hassleri* Rathbun, 1925Género *Heterocrypta* Stimpson, 1871*Heterocrypta macrobrachia* Stimpson, 1871**Heterocrypta occidentalis* (Dana, 1854)Género *Leiolambrus* A. Milne Edwards, 1878*Leliolambrus punctatissimus* (Owen, 1839)Género *Mesorhoea* Stimpson, 1871*Mesorhoea belli* (A. Milne Edwards, 1878)Género *Parthenope* Weller, 1795*Parthenope (Parthenope) hyponca* (Stimpson, 1871)*Parthenope (Platylambrus) exilipes* (Rathbun, 1893)*Parthenope (Pseudolambrus) excavata* (Stimpson, 1871)Género *Solenolambrus* Stimpson, 1871*Solenolambrus arcuatus* Stimpson, 1871

Familia AETIIRIDAE Dana, 1851

Género *Aethra* Leach, 1816*Aethra scutata* Smith, 1869

Superfamilia PORTUNOIDEA Rafinesque, 1815

- Familia PORTUNIDAE Rafinesque, 1815
 Género *Arenaeus* Dana, 1851
 Arenaeus mexicanus (Gerstaecker, 1856)
 Género *Callinectes* Stimpson, 1860
 Callinectes arcuatus Ordway, 1863
 Callinectes belllicosus (Stimpson, 1859)
 Callinectes toxotes Ordway, 1863
 Género *Cronius* Stimpson, 1860
 Cronius ruber (Lamarck, 1810)
 Género *Euphyllax* Stimpson, 1860
 Euphyllax dovii Stimpson, 1860
 Euphyllax robustus A. Milne Edwards, 1861
 Género *Portunus* Weber, 1795
 Portunus acuminatus (Stimpson, 1871)
 Portunus asper (A. Milne Edwards, 1861)
 Portunus iridescentis (Rathbun, 1893)
 Portunus xanthus affinis (Faxon, 1893)
 Portunus xanthus xanthus (Stimpson, 1860)
- Superfamilia CORYSTOIDEA Samouelle, 1819
- Familia CANCRIDAE Latreille, 1803
 Género *Cancer* Linnaeus, 1758
 Cancer amphioctetus Rathbun, 1898
 Cancer johngarthi Carvacho, 1989
- Superfamilia XANTHOIDEA MacLeay, 1838
- Familia XANTHIIDAE MacLeay, 1838
 Género *Actaea* de Haan, 1833
 Actaea angusta Rathbun, 1898
 Género *Cataleptodius* Guinot, 1967
 Cataleptodius occidentalis (Stimpson, 1871)
 Género *Chacellus* Guinot, 1969
 Chacellus pacificus Hendrickx, 1989
 Género *Cyclozanthops* Rathbun, 1897
 Cyclozanthops vittatus (Stimpson, 1860)
 Género *Edwardsius* Guinot, 1967
 Edwardsius lobipes (Rathbun, 1898)
 Género *Epixanthus* Heller, 1861
 Epixanthus tenuidactylus (Lockington, 1877)
 Género *Eriphia* Latreille, 1817
 Eriphia squamata Stimpson, 1859
 Género *Eurypanopeus* A. Milne Edwards, 1878
 Eurypanopeus confragosus Rathbun, 1933
 Eurypanopeus planus (Smith, 1869)
 **Eurypanopeus planissimus* (Stimpson, 1860)
 Género *Eurytium* Stimpson, 1859
 Eurytium albidiigitus Rathbun, 1933
 Eurytium affine Streets & Kingsley, 1876
 Género *Heteractaea* Lockington, 1876
 Heteractaea lunata (H. Milne Edwards & Lucas, 1843)
 Género *Hexapanopeus* Rathbun, 1898
 Hexapanopeus orcutti Rathbun, 1930
 Hexapanopeus sinaloensis Rathbun, 1930

- Género *Liomera* Dana, 1851
 Liomera cinctimana (White, 1847)
 Género *Lipaesthesius* Rathbun, 1898
 **Lipaesthesius leeanus* Rathbun, 1898
 Género *Medaeus* Dana, 1851 (*sensu* Rathbun, 1930)
 Medaeus spinulifer (Rathbun, 1898)
 Género *Menippe* de Haan, 1833
 Menippe frontalis A. Milne Edwards, 1879
 Género *Metopocarcinus* Stimpson, 1860
 Metopocarcinus truncatus Stimpson, 1860
 Género *Microcassiope* Guinot, 1967
 Microcassiope xantusi (Stimpson, 1871)
 Género *Micropanope* *sensu* Stimpson, 1871
 Micropanope cristimanus Stimpson, 1871
 Género *Nanocassiope* Guinot, 1967
 **Nanocassiope polita* (Rathbun, 1893)
 Género *Ozius* H. Milne Edwards, 1834
 Ozius perlatus Stimpson, 1859
 Ozius verreauxii de Saussure, 1853
 Género *Panopeus* II. Milne Edwards, 1834
 Panopeus bermudensis Benedict & Rathbun, 1891
 Panopeus chilensis H. Milne Edwards & Lucas, 1844
 Panopeus purpureus Lockington, 1876
 Panopeus cf. mirafloresensis Abele & Kim, 1989
 Género *Paractaea* Guinot, 1969
 **Paractaea sulcata* (Stimpson, 1860)
 Género *Pilumnus* Leach, 1815
 **Pilumnus gonzalensis* Rathbun, 1893
 **Pilumnus limosus* Smith, 1869
 Pilumnus pygmaeus Boone, 1927
 Pilumnus reticulatus Stimpson, 1860
 Pilumnus townsendi Rathbun, 1923
 Género *Platypodiella* Guinot, 1967
 Platypodiella rotundata (Stimpson, 1860)
 Género *Quadrella* Dana, 1851
 Quadrella nitida Smith, 1869
 Género *Xanthodius* Stimpson, 1859
 Xanthodius sternberghii Stimpson, 1859
 Xanthodius stimpsoni (A. Milne Edwards, 1860)
- Familia GONEPLACIDAE MacLeay, 1838
 Género *Chasmocarcinus* Rathbun, 1898
 Chasmocarcinus latipes Rathbun, 1898
 Género *Chasmophora* Rathbun, 1914
 Chasmophora macrophthalma (Rathbun, 1898)
 Género *Cyrtoplax* Rathbun, 1914
 Cyrtoplax schmitti Rathbun, 1935
 Género *Euryplax* Stimpson, 1859
 Euryplax palita Smith, 1870
 Género *Malacoplax* Guinot, 1969
 Malacoplax californiensis (Lockington, 1877)
 Género *Oediplax* Rathbun, 1893
 Oediplax granulata Rathbun, 1893

- Género *Panoplax* Stimpson, 1871
Panoplax mundata Glassell, 1935
- Género *Pseudorhombila*
**Pseudorhombila xanthiformis* Garth, 1940
- Género *Speocarcinus* Stimpson, 1859
Speocarcinus granulimanus Rathbun, 1893
- Género *Trizocarcinus* Rathbun, 1914
Trizocarcinus dentatus Rathbun, 1893
- Superfamilia GRAPSIDOIDEA MacLeay, 1838
- Familia GECARCINIDAE MacLeay, 1838
- Género *Cardisoma* Latreille, 1828
Cardisoma crassum Smith, 1870
- Género *Gecarcinus* Leach, 1814
Gecarcinus planatus Stimpson, 1870
Gecarcinus quadratus de Saussure, 1853
- Familia GRAPSIDAE MacLeay, 1838
- Subfamilia Grapsinae MacLeay, 1838
- Género *Geograpsus* Stimpson, 1858
Geograpsus lividus (H. Milne Edwards, 1837)
- Género *Goniopsis* de Haan, 1833
Goniopsis pulchra (Lockington, 1876)
- Género *Grapsus* Lamarck, 1801
Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)
- Género *Pachygrapsus* Randall, 1840
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)
- Género *Planes* Bowdich, 1825
Planes cyaneus Dana, 1852
- Subfamilia Plagusiinae Dana, 1851
- Género *Percnon* Gistel, 1851
Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853)
- Género *Plagusia* Latreille, 1804
Plagusia depressa tuberculata Lamarck, 1818
Plagusia immaculata Lamarck, 1818
- Subfamilia Sesarminoidea Dana, 1851
- Género *Aratus* Milne Edwards, 1853
Aratus pisoni (H. Milne Edwards, 1837)
- Género *Sesarmina* Say, 1817
Armases magdalenense (Rathbun, 1918)
Sesarmina rhizophorae Rathbun, 1906
Sesarmina sulcatum Smith, 1870
- Subfamilia Varuniniae H. Milne Edwards, 1853
Género *Tetragrapsus* Rathbun, 1918
Tetragrapsus jouyi (Rathbun, 1893)

- Superfamilia PINNOTHEROIDEA de Haan, 1833
- Familia PINNOTHERIDAE de Haan, 1833
- Subfamilia Pinotherinae de Haan, 1833
- Género *Calyptroatheres* Campos, 1990
Calyptroatheres granti (Glassell, 1933)
- Género *Clypeasterophilus* Campos & Griffith, 1990
**Clypeasterophilus ususfructus* (Griffith, 1987)
- Género *Dissodactylus* Smith, 1870
**Dissodactylus xantusi* Glassell, 1936
- Género *Pinnotheres* Bosc, 1801-1802
**Pinnotheres orcutti* Rathbun, 1918
- Subfamilia Pinnothereliniae Alcock, 1900
- Género *Pinnixa* White, 1846
Pinnixa affinis Rathbun, 1898
Pinnixa pembertoni Glassell, 1935
Pinnixa cf. schmitti Rathbun, 1918
Pinnixa transversalis (H. Milne Edwards & Lucas, 1844)
Pinnixa valerii Rathbun, 1931
Pinnixa sp. 1
Pinnixa sp. 2
- Género *Scleropla* Rathbun, 1893
Scleropla granulata Rathbun, 1892
- Género *Tetrias* Rathbun, 1898
**Tetrias scabripes* Rathbun, 1918
- Género *Tumidotheres* Campos, 1989
**Tumidotheres margarita* (Smith, 1869)
- Superfamilia OCYPODOIDEA Rafinesque, 1815
- Familia OCYPODIDAE Rafinesque, 1815
- Subfamilia Ocyopodinae Dana, 1851
- Género *Ocypode* Fabricius, 1798
Ocypode occidentalis Stimpson, 1860
- Género *Uca* Leach, 1814
Uca (Uca) princeps princeps (Smith, 1870)
Uca (Leptuca) latimanus (Rathbun, 1893)
Uca (Leptuca) musica musica Rathbun, 1914
Uca (Leptuca) crenulata crenulata (Lockington, 1877)
Uca (Minuca) zacae Crane, 1941
Uca (Minuca) vocator ecuadorensis Maccagno, 1928
- Género *Ucides* Rathbun, 1897
Ucides occidentalis (Ortmann, 1897)
- Familia PALICIDAE Rathbun, 1898
- Género *Palicus* Philippi, 1838
Palicus fragilis (Rathbun, 1893)

DISCUSIÓN

El inventario contiene 350 especies distribuidas en 53 familias y 187 géneros. Su repartición en grandes grupos taxonómicos es como sigue: Dendrobranchiata (Penacoidea), 19 especies; Caridea, 61 especies; Thalassinidea, 8 especies; Palinura, 4 especies; Anomura, 74 especies; Brachyura, 184 especies (Cuadro 1). Comparativamente con la fauna de crustáceos decápodos del golfo de California, donde se ha detectado hasta la fecha la presencia de 534 especies (adaptado de Hendrickx, 1992), el sur de Sinaloa presenta una riqueza faunística notable, ya que alcanza casi el 66% de las especies conocidas para esta área. Si se toma en cuenta la Provincia de Cortez (*i.e.* el golfo de California) extendida hasta bahía Magdalena, tal como lo sugiere Hendrickx (*op. cit.*), este porcentaje desciende a 62%. Solamente 7 familias presentes en el golfo de California no aparecen en el sur de Sinaloa. Estas son: Crangonidae (Caridea); Parapaguridae y Lithodidae (Anomura); Dynomenidae, Tymolidae, Atelecyclidae y Cryptochiridae (Brachyura). Juntas, estas familias presentan solamente 9 especies distribuidas en parte del golfo de California. Vale la pena subrayar que no fueron consideradas aquí las familias Daldorfidae Rathbun, 1904 y Dairididae (*sensu* Guinot, 1978 y *sensu* Ng y Rodríguez, 1986).

Para el sur de Sinaloa, los Penacoidea representan el 86% de la fauna conocida del Golfo, los Caridea el 54%, los Palinura el 67%, los Thalassinidea el 57%, los Anomura el 69% y los Brachyura el 68%. En otros términos, la representación de la fauna de crustáceos decápodos del Golfo de California en los ecosistemas marinos y de aguas salobres del sur de Sinaloa es relativamente estable a través de los diversos grupos, con un notable máximo (86%) en el caso de los Penacoidea y un mínimo en el caso de los Caridea (54%). Estos dos valores pueden interpretarse por la dominancia, en la zona de estudio, de sistemas con fondos blandos o mixtos (plataforma, esteros, lagunas y playas arenosas) que favorecen la presencia de los camarones Penacidae, Solenoceridae y Sicyoniidae, al mismo tiempo que limita la presencia de las especies de Caridea asociados preferentemente con hábitats rocosos o coralinos. En el caso de los Thalassinidea (57%), el dato es poco significativo tomando en cuenta el bajo número de especies y la falta de información confiable acerca de la fauna de Callianassidae.

Con 350 especies conocidas hasta la fecha, los crustáceos decápodos del sur de Sinaloa representan, sin lugar a dudas, uno de los conjuntos faunísticos más diversificados de la región del Pacífico tropical este. La variedad de ambientes disponibles para el establecimiento y el desarrollo de comunidades esencialmente tropicales en el área ha propiciado esta riqueza y ha podido mantenerla. El impacto ambiental que experimenta actualmente la zona costera (sobre pesca, impacto mecánico de las artes de pesca, capturas descontroladas en las playas rocosas, desarrollos turísticos, contaminación en aguas costeras) podría, a corto plazo, modificar profundamente las estructuras comunitarias establecidas. De hecho, estos factores de alteración ya tuvieron un efecto nefasto sobre la distribución o abundancia de ciertas especies. Desafortunadamente, este proceso parece ser irreversible.

Cuadro 1. Número de géneros y especies en las familias de crustáceos decápodos para el sur de Sinaloa y para el golfo de California*

Familia	Sur de Sinaloa (%)		Golfo de California (= 100%)	
	Número de géneros	Número de especies	Número de géneros	Número de especies
Penaeidae	4	9	4	10
Sicyoniidae	1	8	1	10
Solenoceridae	1	2	T = 19 (86%)	1
Pasiphaeidae	1	1	1	1
Palaemonidae	9	13	17	31
Gnathophyllidae	1	1	1	1
Alpheidae	5	28	9	51
Hippolytidae	5	7	7	12
Ogyrididae	1	1	1	1
Processidae	2	3	2	5
Pandalidae	4	7	4	8
Crangonidae	—	—	T = 61 (54%)	2
Scyllaridae	1	1	2	2
Palinuridae	1	3	T = 4 (67%)	1
Axiidae	3	3	5	5
Callianassidae	1?	2?	1?	2?
Upogebiidae	1	3	T = 8 (57%)	2
Albuneidae	2	5	2	7
Hippidae	2	2	2	4
Coenobitidae	1	1	1	1
Diogenidae	7	14	9	19
Paguridae	5	9	10	22
Parapaguridae	—	—	1	1
Lithodidae	—	—	1	1
Galatheidae	2	2	2	5
Porcellanidae	13	41	T = 74 (69%)	13
Dromiidae	2	3	2	4
Dynomenidae	—	—	1	1
Tymolidae	—	—	1	2
Raninidae	1	1	4	5
Dorippidae	1	3	1	4
Calappidae	6	9	6	9
Leucosiidae	7	13	8	15
Inachidae	4	9	4	11
Inachoididae	5	7	5	8

Cuadro 1. (concluye)

Familia	Sur de Sinaloa (%)		Golfo de California (= 100%).	
	Número de géneros	Número de especies	Número de géneros	Número de especies
Tychidae	1	2	2	3
Epialtidae	3	5	5	7
Pisidae	4	7	8	12
Majidae	1	1	1	1
Mithracidae	7	12	8	18
Atelecyclidae	—	—	1	1
Parthenopidae**	6	9	9	15
Aethridae	1	1	1	1
Portunidae	5	12	5	15
Cancridae	1	2	1	2
Xanthidae	26	39	37	60
Goneplacidae	10	10	13	16
Gecarcinidae	2	3	2	3
Grapsidae	10	13	12	16
Pinnotheridae	7	14	11	26
Ocypodidae	3	8	3	11
Palicidae	1	1	1	4
Cryptocheriodae	—	—	T = 184 (68%)	T = 270
Totales: 53	187	350	256	532

* Los porcentajes fueron calculados considerando que la fauna del golfo equivale a 100%.

** *sensu lato*, incluyendo *Daldorfia* y *Mesorhoea*

T = totales parciales por grupos.

AGRADECIMIENTOS

El autor desea agradecer a todas las personas que participaron de manera activa en los programas de recolección de organismos en el área del sur de Sinaloa, ya sea en las salidas al campo o en las campañas oceanográficas. En particular, se agradece a A. van der Heiden y A. Toledano y a todos los estudiantes y ex-estudiantes tesistas del fallecido "Laboratorio de Invertebrados y Peces Bentónicos", Estación Mazatlán UNAM (1979-1989), y del actual "Laboratorio de Invertebrados Bentónicos". Se agradece también a los numerosos colegas quienes, desde 1978 y mediante su ayuda desinteresada, permitieron en muchas ocasiones aclarar dificultosos problemas taxonómicos: John Garth, Janet Haig, Mary Wicksten, Richard Brusca, Lipke Holthuis, Danièle Guinot y Alain Crosnier, así como a Mercedes Cordero por la ayuda proporcionada en la preparación del manuscrito final.

LITERATURA CITADA

- BOWMAN, T. E. y I. G. ABLE. 1982. Classification of the recent Crustacea. *Biol. Crust.* 1: 7-27.
- BRUSCA, R. C. 1980. *Common intertidal invertebrates of the Gulf of California*, 2nd. ed. University of Arizona Press, Tucson.
- BRUSCA, R. C. y B. R. WALLERSTEIN. 1979. Zoogeographic patterns of idoteid isopods in the northeast Pacific, with a review of shallow-water zoogeography of the area. *Bull. Biol. Soc. of Washington* 3: 67-105.
- CORREA-SANDOVAL, F. 1991. *Catálogo y bibliografía de los cangrejos (Brachyura) del Golfo de California*. Centro de Investigaciones Científicas Educación Superior de Ensenada, B. C.: 117.
- CHACE, F. A. 1992. On the classification of the Caridea (Decapoda). *Crustaceana* 63 (1): 70-80.
- CHRISTOFFERSEN, M. L. 1989. Phylogeny and classification of the Pandaloidae (Crustacea, Caridea). *Cladistics* 5: 259-274.
- CHRISTOFFERSEN, M. L. 1990. A new superfamily classification of the Caridea (Crustacea: Pleocyemata) based on phylogenetic pattern. *Z. Zool. Syst. Evolut. Forsch.* 28: 94-106.
- DRACH, P., y D. GUINOT. 1983. Zoologie des invertébrés. Les Inachoididae Dana, famille de Majoidea caractérisée par des connexions morphologiques d'un type nouveau entre carapace, pleurites, sternites et pléon (Crustacea: Decapoda). *C. R. Acad. Sc. Paris, Ser. 3* (297): 37-42.
- FELDMANN, R. M. y R. B. MANNING. 1992. Crisis in systematic biology in the "age of biodiversity". *J. Paleont.* 66 (1): 157-158.
- GARTH, J. S. 1958. Brachyura of the Pacific coast of America; Oxyrhyncha. *Allan Hancock Puc. Exped.* 21 (1-2): 1-854.
- GARTH, J. S. 1960. Distribution and affinities of the Brachyuran Crustacea. In: J. D. Wyatt and E. C. Allison (eds.). *The biogeography of Baja California und adjacent seas, Part II. Marine Biotas. Systematic Zool.* 9: 105-123.
- GUINOT, D. 1969. Recherches préliminaires sur les groupements naturels chez les crustacés décapodes brachyoures. VII. Les Gonoplacidae. *Bull. Mus. Natn. Hist. Nat.* 2e. Sér. 41 (1): 241-265.
- GUINOT, D. 1977. Zoologie. Propositions pour une nouvelle classification des crustacés décapodes brachyoures. *Note. C.R. Acad. Sc. Paris* 285: 1049-1052.
- GUINOT, D. 1978. Principes d'une classification évolutive des crustacés décapodes brachyoures. *Bull. Biol. France et Belgique* 112 (3): 211-292.
- HENDRICKX, M. E. 1984. The species of *Sicyonia* H. Milne Edwards (Crustacea: Penaeoidea) of the Gulf of California, Mexico, with a key for their identification and a note on their zoogeography. *Rev. Biol. Trop.* 32 (2): 279-298.
- HENDRICKX, M. E. 1986. Estudio faunístico y ecológico de las comunidades bentónicas de invertebrados (moluscos y crustáceos) del golfo de California, México. In: *Memorias I Intercambio Académico sobre el golfo de California. Hermosillo, Sonora, México, 9-11 de abril 1986*. CICTUS-CONACyT: 170-187.
- HENDRICKX, M. E. 1992. Distribution and zoogeography of decapod crustaceans of the Gulf of California, Mexico. *Proc. Biol. Soc. San Diego* 20: 1-12.
- HENDRICKX, M. E. y F. D. ESTRADA-NAVARRETE 1989. A checklist of the species of pelagic shrimps (Penaeoidea and Caridea) from the eastern Pacific, with notes on their geographic and depth distribution. *CalCOFI Rep.* 30: 104-121.

- HENDRICKX, M. E. y J. SALGADO-BARRAGÁN. 1991. Los estomatópodos (Crustacea: Hoplocarida) del Pacífico mexicano. *Pub. Esp. Inst. Cienc. Mar y Limnol. UNAM.* 10: 1-2.
- HENDRICKX, M. E., D. P. SÁNCHEZ-VARGAS y L. A. VÁZQUEZ-CUREÑO. 1990. New records of 20 species of Majoidea and Parthenopoidea (Crustacea: Decapoda) along the Pacific coast of Mexico. *Rev. Biol. Trop.* 38 (1): 143-146.
- KIM, W. y L. G. ABELE. 1988. The snapping shrimps genus *Alpheus* from the eastern Pacific (Decapoda: Caridea: Alpheidae). *Smithson. Contrib. Zool.* 454: 1-119.
- MCLAUGHLIN, P. A. y L. B. HOLTHUIS. 1985. Anomura versus Anomala. *Crustaceana* 49 (2): 204-209.
- MANNING, R. B. y D. L. FELDER. 1991. Revision of the American callianassidae (Crustacea: Decapoda: Thalassinidea). *Proc. Biol. Soc. Wash.* 104 (4): 764-792.
- MARTIN, J. W. y L. G. ABELE. 1986. Notes on male pleopod morphology in the brachyuran crab family Panopeidae Ortmann, 1893, *sensu* Guinot (1978) (Decapoda). *Crustaceana* 50 (2): 182-198.
- NG, P. K. L. y G. RODRÍGUEZ. 1986. New records of *Mimilambrus wileyi* Williams, 1979 (Crustacea: Decapoda: Brachyura), with notes on the systematics of the Mimilambridae Williams, 1978, and Parthenopidae McLeay, 1838, *sensu* Guinot, 1978. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 99 (1): 88-99.
- ROSENBLATT, R. 1974. Marine Zoogeography, by J. C. Briggs: A review. *Science* 186: 1028-11029.
- SCHRAM, F. R. 1986. *Crustacea*. Oxford University Press, New York. 6060 pp.
- SERENE, R. 1984. Crustacés Décapodes Brachyoures de l'Océan Indien occidental et de la Mer Rouge. Xanthoidea: Xanthidae et Trapeziidae. Avec un addendum par Alain Crosnier: Carpiliidae et Menippidae. *Faune Tropicale* (24): 1-4.
- UICN/PNUMA/WWF, (1991). *Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la vida*, Gland, Suiza. 252 pp.
- VAN DER HEIDEN, A. M. y M. E. HENDRICKX. 1982. *Inventario de la fauna marina y costera del sur de Sinaloa, México. Segundo Informe de Avance*. Estación Mazatlán, Inst. Cienc. del Mar y Limnol., Univ. Nal. Autón. México. 135 pp.
- VERMEIJ, G. J. 1978. *Biogeography and adaptation. Patterns of Marine Life*. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 332 pp.
- VILLALOBOS-HIRIART, J. L., J. C. NATES-RODRÍGUEZ, A. CANTÚ DÍAZ-BARRIGA, M. D. VALLE-MARTÍNEZ, P. FLORES-HERNÁNDEZ, E. LIRA-FERNÁNDEZ y P. SCHMIDTSDFORF-VALENCIA. 1989. *Listados faunísticos de México. I. Crustáceos estomatópodos y decápodos intermareales de las islas del golfo de California*. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, D.F. 114 pp.
- WICKSTEN, M. K. 1983. A monograph on the shallow-water caridean shrimps of the Gulf of California, Mexico. Allan Hancock Monogr. *Mar. Biol.* 13: 1-59.
- WILLIAMS, A. B. 1986. Mud shrimps, *Upogebia*, from the eastern Pacific (Thalassinoidea: Upogebiidae). *San Diego Soc. Nat. Hist. Mem.* 4: 1-60.
- WILLIAMS, A. B., J. K. SHAW y T. S. HOPKINS T. 1977. *Stilbonastax*, a new genus of spider crab (Majidae: Tychinae) from the West Indies region, with notes on American relatives. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 90 (4): 884-893.