

CATALOGO SISTEMATICO Y ZOOGEOGRAFICO DE LOS LEPIDOPTEROS MEXICANOS

Segunda Parte

HESPERIOIDEA

Por CARLOS C. HOFFMANN,
del Instituto de Biología.

La segunda parte de mi Catálogo de los Lepidópteros Mexicanos comprende la Superfamilia HESPERIOIDEA, con un total de 456 especies mexicanas. Sumando esta cantidad a las 784 especies de PAPILIONOIDEA (782 más 2 números "bis") de la primera parte del Catálogo, se elevan las llamadas "Lepidópteros diurnos" de México a 1240 especies, contra 692 anotadas por **McDunnough** (1938) para los Estados Unidos y Canadá.

De las 221 especies de **Hesperioidea** Norteamericanas (al Norte del Río Bravo), aceptadas por **Bell** en su Catálogo de 1938 (**McDunnough**: 217), más de la mitad, o sean 117, existen también en territorios de la República Mexicana, siendo además probable que un estudio sistemático de nuestros Estados fronterizos (en lo particular: Sonora, Chihuahua y Coahuila) aumente todavía este porcentaje llamativo. Según estos datos, se compone la fauna Norteamericana de **Hesperioidea** hasta las fronteras con Guatemala, de 560 especies, o sean:

Especies propias de México	339
Especies mancomunales de México y Estados Unidos	117
y Especies propias de Estados Unidos y Canadá	104

Un ordenamiento sucesivo adecuado de los géneros centro y sudamericanos de los Hespéridos es obra complicada y difícil. El

sistema actual, empleado por muchos años, de manera más o menos convencional y sin grandes cambios, por la mayoría de los autores (**Mabille, Godman & Salvin, Draudt, Hayward, etc.**), ya no puede satisfacerlos y es ciertamente inferior al sistema creado por **Lindsey, Bell & Williams** para los Hespéridos de los Estados Unidos. Es lamentable que nuestros conocimientos actuales no permitan una adaptación satisfactoria de las especies mexicanas a este sistema. Para lograr este fin se exigen todavía largos años de estudios especializados y sólo podemos lamentar que la guerra europea haya interrumpido los trabajos de revisión emprendidos por **Evans** en Londres, quien con la mayoría de los tipos de los antiguos autores a su alcance, estaba en las mejores condiciones para investigaciones de esta índole.

Parece que la misma guerra ha sido también la causa de que no se hayan terminado y publicado las **Hesperiinae** de **H. H. Shepard** en el **Catalogus Lepidopterorum**. Para el presente trabajo tampoco pude conseguir las partes ya publicadas de esta Subfamilia, ni en Europa ni en los Estados Unidos, y forzosamente tuve que renunciar a comparar su ordenamiento y la sinonimia.

En vista de estas circunstancias he aceptado al fin el siguiente ordenamiento de la familia **Hesperiidae**: En las **Pyrrhopyginae** sigo a los estudios de **Bell** de 1931-1934; las **Pyrginae** están arregladas según **H. H. Shepard** y las **Hesperiinae** según **Godman & Salvin**, siendo la Biología Central Americana de estos autores, después de 40 años, todavía el mejor tratado de las especies mexicanas de este grupo.

Habiendo terminado ya el presente trabajo, recibí, gracias a la fina atención del Dr. **H. H. Shepard**, una lista de los géneros americanos de la subfamilia **Hesperiinae**, con el ordenamiento sucesivo empleado por él en el manuscrito de su Catálogo inconcluso. Lamento que el tiempo no me permita hacer los cambios respectivos en las numeraciones de mi lista, pero tratándose efectivamente sólo de 5 géneros que según **Shepard** deben cambiarse de lugar, doy a continuación los datos pertinentes.

Talides	(en el Cat. Nos. 1230)	según Shepard , después de
		Atalopedes.
Lerodea	(„ „ „ „ 1182-1192)	„ „ después de
		Atrytonopsis.
Potanthus	(„ „ „ „ 1195)	„ „ después de
		Calpodes.
Zariaspes	(„ „ „ „ 1076-77)	„ „ después de
		Potanthus.

Panoquina (en el Cat. Nos. 1118-1125) según **Shepard**, después de
Naevolus (= Cydrus).

Alentado por numerosas cartas y opiniones de estimados colegas y amigos de los Estados Unidos, de América del Sur y del Canadá, no he hecho cambios en la forma y el arreglo general del Catálogo. Por amable recomendación de los Lepidopterólogos del United States National Museum de Washington (**C. Heinrich** y **W. D. Field**) sólo he procurado agregar en las notas bibliográficas los nombres de los géneros de la descripción original de las especies y poner, cuando éstas hayan cambiado, los nombres de los autores entre paréntesis. Siguiendo a **McDunnough** y para ahorrar lugar, había suprimido estos detalles en la primera parte del Catálogo, pero los acepto con gusto para la presente y las siguientes.

Valiosos consejos e importante literatura debo en primer lugar a los especialistas americanos en **Hesperioidea**: Dr. **A. W. Lindsey** de la Denison University, Dr. **H. H. Shepard** de la University of Minnesota, **R. C. Williams jr.** de la Academy of Natural Sciences de Philadelphia y en lo particular **E. L. Bell** del American Museum of Natural History de New York. Una serie completa de sus publicaciones recibí también de **Kenneth J. Hayward** de la República Argentina. Material de estudio y de comparación debo a la atención del Dr. **T. Escalante**, México, y Cpt. **W. P. Medlar** del Natural History Museum de San Diego, Cal. En los dilatados trabajos de preparación y ordenamiento general pude contar además con la ayuda de mis estimados discípulos y ayudantes **Leonila Vázquez**, **Lola Zavaleta** y **Federico Islas**. A todos hago presentes mi afecto y agradecimiento por su amable ayuda y colaboración.

México, 5 de Mayo de 1941.

SUPERFAMILIA

HESPERIOIDEA

Familia HESPERIIDAE

Subfamilia Pyrrhopyginae

PYRRHOPYGE Hbn.

785. **zenodorus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 247, T. 73, figs. 1, 2, 3. (1893).

Tierras caliente y templada de Veracruz, Tabasco, Península de Yucatán.

786. *scylla* Men.

Enum. Corp. Anim. Mus. Imp. Acad. Sci. Petrop., parte I, p. 95, T. 4, fig. 7. (1855).

Sin.: *dulcinea* Ploetz (1879).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero). Cuenca del Río Balsas (hasta Morelos y el Sur de Puebla).

787. *chalybea* Scudd.

Rep. Peab. Acad. Sci. p. 67 (1872).

Sin.: *zereba* Hew. (1871 nec 1866).

Tierras templada y caliente de la Región del Pacífico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, límites de Durango. En toda la Cuenca del Río Balsas. En algunos lugares de la Sierra Volcánica Transversal. Excepcionalmente hasta en alturas de más de 2000 metros.

788. *jonas* Feld.

Wien. Ent. Mon. III. p. 328. (1859).

Sin.: *cydonia* Dr.

Tierra templado-cálida de Veracruz, Oaxaca (región del Istmo), Chiapas.

APYRROTHRIX Linds.

789. *araxes* (Hew.)

Erycides araxes, Descr. Hesp. p. 2 (1867).

Sin.: *cyrillus* Ploetz.

Tierras templada y templado-cálida de casi toda la República. En las montañas del Centro sube a unos 2300 metros (Valle de México, Valle de Puebla, etc.)

a. *araxes arizonae* (Godm. & Salv.)

Pyrrhopyge arizonae, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 253 (1893).

Sierra Madre Occidental (de Sonora hasta Colima). Aparentemente sólo en regiones secas o en la estación seca.

790. *erythrosticta* (G. & S.)

Pyrrhopyge erythrosticta, Proc. Zool. Soc. London, p. 153 (1879).

Tierra caliente de Chiapas. Oaxaca (región del Istmo).

791. *plancartei* C. C. Hoffm.

Anal. Inst. Biol. México, XII, p. 231 (1941).

Tierra caliente del Sur de Veracruz.

MYSORIA Watson.

792. *venezuelae* (Scudd.)

Pyrrhopyge venezuelae, Rep. Peab. Acad. Sci. p. 67 (1872).

Sin.: *ambigua* Mab. & Boull., *proxima* Mab. & Boull.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

793. *affinis* (H. -S.)

Pyrrhopyge affinis, Prod. Syst. Lep. III, p. 57 (1869).

Tierras caliente y templada de la Sierra Madre del Sur y en la costa de Guerrero. Cuenca del Río Balsas. Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa.

794. *amra* (Hew.)

Pyrrhopyge amra, Exot. Butt. 4. Pyrrh. T. 3, figs. 16, 17 (1871).

Tierras caliente y templado-cálida de la región del Pacífico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit (con preferencia en la planicie costera). Interior de Chiapas (región de Ocozocoautla).

YANGUNA Wts.

795. *crida* (Hew.)

Pyrrhopyga crida, Trans. Ent. Soc. London, p. 167. (1871).
Oaxaca (región del Istmo, Tutla), tierra caliente.

JEMADIA Wts.

796. *hospita* (Btl.)

Pyrrhopyga hospita, Ann. Mag. Nat. Hist. XX, p. 128, (1877).
Sin.: *patrobas* Hew (1857 descr. partim nec, T. I, fig. 1), *pseudognetus* Mab.,
ulyxes Ploetz, *ulyxes* Mab. & B., *hephaestos* Ploetz, *imitator* Mab., *lisetta* Mab.
& B.
Tierra caliente de Tabasco y el Sur de Veracruz.

SARBIA Wats.

797. *luteizona* (Mab.)

Pyrrhopyga luteizona, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877).
Se indica que el tipo vino de México. —No he visto ejemplares mexicanos.

MYSCELUS Hbn.

798. *amystis* Hew.a. *amystis hages* G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 266, T. 74, figs. 24, 25. (1893).
Sin.: *rogersi* Kaye.
Tierras caliente y templado-cálida de la región del Golfo hasta el Sur de
Tamaulipas y partes colindantes de San Luis Potosí. Por el lado del Pacífi-
co en la Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero).

799. *belti* G. & S.

Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1879).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco y el Sur de Veracruz.

a. *belti perissodora* Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 47. p. 366 (1915).
Tierras caliente y templada del Centro y Norte de Veracruz.

OXYNETRA Feld.

800. *semihyalina* Feld.

Wien. Ent. Mon. VI. p. 180 (1862).
Sin.: *confusa* Staudg.
Según Felder es México el país de procedencia del tipo. No he visto ejem-
plares mexicanos.

801. *hopfferi* Stgr.

Exot. Schmett. p. 294, T. 99 (*felderi*). (1888).
Tierra caliente del Sur de Veracruz. (Presidio, Motzorongo).

Subfamilia Pyrginae

Grupo A

PHOCIDES Hbn.

802. *lilex* (Reak.)

Erycides lilex, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVIII. p. 339 (1866).
Sin.: *albicilla* H. S., *socius* Butl. & Drc., *sanguinea* Scudd., *cruentus* Scudd.,
decolor Mab., *albiciiliata* Roerber.

En todo el Sur y por las 2 costas hasta el Sur de Tamaulipas y Sur de Sinaloa. En la Mesa Central en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Desde la tierra caliente hasta los límites de la tierra fría.

803. **pialia** (Hew.)

Pyrrhopyga pialia, Exot. Butt. T. 2, fig. 12 (1857).

No he visto ejemplares mexicanos. (Según Mabille, Draudt, etc., en México y Guatemala).

804. **pigmalion** (Cr.)

Papilio pigmalion, Pap. Exot. III. p. 87, T. 245, figs. A, B. (1782).

Sin.: *pygmalion* H. -S., *gnetus* Latr. (nec Fabr.), *hewitsonius* Mab., *licinus* G. & S. (nec Mschl.)

Tierra caliente de Campeche, Tabasco y el Sur de Veracruz. Por el lado del Pacífico, de Chiapas a Colima en las tierras caliente y templado-cálida.

805. **belus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 293, T. 76, figs. 17-18 (1893).

Por el lado del Golfo en la tierra caliente de Campeche; Tabasco, Veracruz y el sur de Tamaulipas. Por el lado del Pacífico en las tierras caliente y templado-cálida de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y las montañas limítrofes con Durango.

806. **urania** (Ww. & Hew.)

Erycides urania, Gen. Diur. Lep. II. p. 510, T. 79, fig. 1 (1852).

Sin.: *texana* Scudd.

Tierras templada y caliente de toda la región del Golfo. Por el lado del Pacífico en la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Occidental hasta Sinaloa y Durango.

URBANUS Hbn.

807. **proteus** (L.)

Papilio proteus, Syst. Nat. I. p. 484 (1758).

Sin.: *domingo* Scud., *proteoides* Ploetz.

En toda la República hasta unos 2300 metros o algo más.

forma *viterboana* (Ehrm.)

Thymele viterboana, Canad. Ent. 39, p. 312 (1907).

Sin.: *huancavillcas* Wlls.

Cuenca del Río Balsas, tierra caliente de Veracruz y otras partes.

808. **esmeraldus** (Butl.)

Goniurus esmeraldus, Trans. Ent. Soc. p. 146 (1877).

Tierra caliente de Tabasco y Veracruz. Por el lado del Pacífico en las vertientes de las Sierras Madres hasta Colima.

809. **dorantes** (Stoll).

Papilio dorantes, Suppl. Cram. Pap. Exot. p. 172, T. 39, fig. 9. (1791).

Sin.: *proteus* Hbn. (nec L.), *torones* Hbn., *amisus* Hew., *protillus* H. -S., *kefersteinii* Ploetz, *rauterbergi* Skinn.

En todas partes hasta unos 2300 metros sobre el nivel del mar.

a. **dorantes calafia** (Williams).

Eudamus dorantes calafia, Trans. Amer. Ent. Soc. 52, p. 63, T. II, fig. 2 (1926). Baja California.

810. **undulatus** (Hew.)

Eudamus undulatus, Descr. Hesp. p. 4 (1867).

Sin.: *sumichrasti* Scudd., *nicasius* Ploetz.

Tierras caliente y templado-cálida de la región del Pacífico (de Chiapas a Sinaloa); por el lado del Golfo en Tabasco y Veracruz.

811. **eurycles** (Latr.)
Hesperia eurycles, Enc. Méth. IX. p. 730 (1723).
Sin.: dorantes Hbn. (nec Stoll), teleus Hbn. (part.), euricles Prittw., zagorus Ploetz, zalanthus Ploetz, latipennis Mab. & V.
Tierras templada y caliente de casi toda la República.
812. **simplicius** (Stoll).
Papilio simplicius, Suppl. Cram. Pap. Exot. p. 171. T. 39, figs. 6, 6 e (1791).
Sin.: dorantes Hbn. (nec Stoll), teleus Hbn. (part.), pilatus Ploetz, procne Ploetz, thiemei Ehrm., borja Ehrm.
Tierras templada y caliente de todo el país.
813. **chaes** (G. & S.)
Eudamus chaes, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 274 (1893).
Tierra caliente de la Costa del Pacífico. (Guerrero a Sinaloa).
814. **doryssus** (Swains.)
Eudamus doryssus, Zool. III, serie 2, II, T. 48, fig. 2 (1831).
Sin.: leucites Mab., albicuspis Shepard (nec H. -S.)
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Península de Yucatán.
forma **interruptus** (Williams).
Eudamus doryssus forma interruptus, Trans. Amer. Ent. Soc. 52, p. 65 (1926).
Tierra caliente del Sur de Veracruz.
815. **octomaculata** (Sepp.)
Hesperia octomaculata, Surinam Vlind. II. T. 58, fig. 23 (1848).
Sin.: decurtata H. -S., calenus Mab.
Tierras caliente y templado-cálida del Sur de la República hasta Veracruz y Guerrero.
816. **auginus** (Hew.)
a. **auginus auginulus** (G. & S.)
Eudamus auginulus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 284, T. 75, figs. 20, 21 (1893).
Tierra caliente de Campeche, Tabasco, Veracruz, Sierra Madre del Sur.
817. **alciphron** (G. & S.)
Eudamus alciphron, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 285, T. 75, figs. 24, 25 (1893).
Tierras caliente y templada de Guerrero, Oaxaca, Veracruz.
818. **asine** (Hew.)
Eudamus asine, Descr. Hesp. p. 6. (1867).
Sin.: vitreus Scudd.
Tierras caliente y templado-cálida de la Región del Pacífico, de Chiapas a Sinaloa. Cuenca inferior del Río Balsas. Península de Yucatán, tierra caliente de Veracruz.
819. **miltas** (G. & S.)
Eudamus miltas, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 282, T. 75, figs. 18, 19 (1893).
Tierra templada de Veracruz (Jalapa).
820. **ceculus** (H. -S.)
Eudamus ceculus, Corresp. Blatt Regensb. 23, p. 170 (1869).
Sin.: lindora Btlr., auginus G. & S. (nec Hew.)
Tierra caliente de Veracruz.
821. **hyster** (Dyar.)
Eudamus hyster, Proc. U. S. Natl. Mus. 51, p. 3 (1917).
Tierra caliente del Sur de Veracruz, Oaxaca, Guerrero.

AGUNA Williams.

822. **metophis** (Latr.)

Hesperia metophis, Enc. Meth. IX. p. 729 (1823).

Tierra caliente del Sur de Veracruz, Oaxaca (región del Istmo), Península de Yucatán.

823. **albistria** (Ploetz).

Goniurus albistria, Bull. Soc. Nat. Moscow, 55, p. 19 (1880).

Sin.: cholut, leucodesma Godm., glaphyrus Mab., guatemalaina Ehrm. Chiapas.

824. **coelus** (Cram.)

Papilio coelus, Pap. Exot. IV. p. 102. T. 343, figs. C, D. (1782).

Sin.: caelus Wats., aurunce Hew., hypozonius Ploetz.

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Yucatán a Veracruz).

825. **asander** (Hew.)

Eudamus asander, Descr. Hesp. p. 9 (1867).

Sin.: euthymides Mab. & B., antaeus Draudt (nec Hew.)

Tierras templada y caliente de todo el Sur y por las dos costas hasta Sinaloa, Durango y Veracruz. Sube hasta alturas de unos 2000 metros sobre el nivel del mar.

forma **panthius** (H. -S.)

Eudamus panthius, Corr. Blatt. Regensb. 23. p. 186 (1869).

Sin.: arsaces Mab.

Quintana Roo, Guerrero, Colima.

CHIOIDES Linds.

826. **albofasciatus** (Hew.)

Eudamus albofasciatus, Descr. Hesp. p. 3 (1867).

Tierras caliente y templada de todo el Sur y por las 2 costas hasta Sonora y Tamaulipas, Cuenca del Río Balsas.

827. **zilpa** (Butl.)

Goniurus zilpa, Lep. Exot. p. 109, T. 40, fig. 2 (1870).

Sin.: zilpha Skin.

Tierras templada y caliente de todo el Sur y por las 2 costas y Sierras hasta Sonora y Tamaulipas. Cuenca del Río Balsas.

ZESTUSA Linds.

828. **dorus** (Edw.)

Eudamus dorus, Papilio II, p. 140 (1882).

Sonora, Sierra Madre Occidental.

829. **elwesi** (G. & S.)

Plestia elwesi, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 289, T. 76, figs. 5-7 (1893).

Tierra templada de la Cuenca del Río Balsas, Michoacán (Uruapan), Sierra Madre del Sur (Guerrero), Veracruz (Orizaba).

CODATRACTUS Linds.

830. **bryaxis** (Hew.)

Eudamus bryaxis, Descr. Hesp. p. 11 (1867).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Por el lado del Pacífico en la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Occidental hasta Colima.

831. **cyda** (G. & S.)
Heteropia cyda, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. Suppl. p. 734. T. 112, figs. 7, 8. (1901).
 Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.
832. **cyledis** (Dyar.)
Heteropia cyledis, Proc. U. S. Natl. Mus. 42, p. 42. (1912).
 Valle de Tehuacán (Sur de Puebla).
833. **melon** (G. & S.)
Heteropia melon, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 297, T. 76, figs. 26-27 (1893).
 Tierras templada y caliente y subiendo hasta alturas de más de 2000 metros en todo el Sur y por las 2 Costas hasta Sonora y Tamaulipas. En toda la Cuenca del Río Balsas.
 forma **arizonensis** (Skin.)
Eudamus arizonensis, Ent. News 16, p. 232 (1905).
 Ejemplares de *arizonensis* y formas intermedias se encuentran en la Región Noroeste y en el Centro hasta Guerrero y Oaxaca.
834. **alcaeus** (Hew.)
Eudamus alcaeus, Descr. Hesp. p. 3 (1867).
 Sin.: *montezuma* Scudd.
 Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Oaxaca (región del Istmo), Chiapas. Sierra Madre del Sur. Sierra Madre Occidental.

PROTEIDES Hbn.

835. **clarus** (Cram.)
Papilio clarus, Pap. Exot. I, p. 66, T. 41, figs. E, F. (1779).
 Sin.: *tityrus* Fabr (nec Poda), *californica* Smith.
 Sonora, Baja California.
836. **exadeus** (Cram.)
Papilio exadeus, Pap. Exot. III. p. 118. T. 260, fig. C. (1782).
 Sin.: *clavicornis* H. -S., *orizaba* Scudd., *tityrus* var. Latr., *exadens* Davis.
 Tierras templada y caliente de todo el Sur, Cuenca del Río Balsas. Por las 2 costas hasta Sonora, Baja California y el Sur de Tamaulipas.
837. **mercurius** (Fabr.)
Papilio mercurius, Mant. Ins. II. p. 86 (1787).
 Sin.: *idas* Cram. (nec L.)
 Tierras templada y caliente de todo el Sur. Cuenca del Río Balsas. Sube a alturas de más de 2000 metros. (Valle de México). Por el lado del Pacífico hasta Sonora, por el lado del Golfo hasta el Sur de Tamaulipas.

CHRYSOPECTRUM Wts.

838. **pernicius** (H. - S.)
Eudamus pernicius, Prod. Syst. Lep. III. p. 65 (1868).
 Sin.: *epicincia* Btl., *perniciosum* G. & S.
 Tierras templado-cálida y caliente de Veracruz (Atoyac, Presidio).

POLYGONUS Hbn.

839. **lividus** Hbn.
Samml. exot. Schmett. II. T. 144 (1825).
 Sin.: *amyntas* Fabr. (nec Poda), *savigny* Latr., *histrío* Rbr.
 Tierras templada y caliente de toda la República.
 forma **arizonensis** (Skin.)
Erycides arizonensis, Trans. Amer. Ent. Soc. 37, p. 209, T. 10 (1911).

Sin.: pallida Rbr.

Forma (no exclusiva) de las regiones secas o de la estación seca del Norte, Noroeste y Occidente del país. También en Tehuacán, Pue., la Mixteca, Cuenca del Balsas, Valle de México, etc.

ASTRAPTES Hbn. (= TELEGONUS Hbn.)

840. talus (Cram.)

Papilio talus, Pap. Exot. II. p. 122, T. 176, fig. D (1779).

Sin.: ausninus Latr., lucidator Sepp., sumadue Lucas.

Tierras templada y caliente de la región del Golfo.

841. brevicauda (Ploetz).

Goniurus brevicauda, Stett. Ent. Zeit. 47, p. 88 (1884).

Sin.: eniopeus G. & S.

Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz, Tabasco.

842. fuligator (Walch).

Papilio fuligator, Naturf. VII. p. 115, T. 1, figs. 2 a, b. (1775).

Sin.: fulgurator Btl. & Dr., fulminator Sepp., mercatus F., azul Reak., misitra Ploetz, enotrus Draudt (nec Cram.), albifasciatus Roeber.

Tierras templada y caliente del Sur y de las dos Costas hasta Sinaloa y el

Sur de Tamaulipas.

843. egregius (Btlr.)

Telegonus egregius, Trans. Ent. Soc. Lond. IV. p. 494 (1870).

Tierras templada y caliente de Campeche, Yucatán, Tabasco, Veracruz. Por el lado del Pacífico hasta Colima.

844. enotrus (Cram.)

Papilio enotrus, Pap. Exot. IV. p. 144, T. 364, figs. G. H. (1782).

Sin.: aulus Draudt (nec Ploetz) 1922, T. 168a, cara superior.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero).

845. aulestes (Cram.)

Papilio aulestes, Pap. Exot. III. p. 161, T. 283, figs. E, F, G. (1782).

Sin.: narcosius Stoll.

Tierra caliente del Sur de Veracruz, Tabasco, Península de Yucatán, Chiapas.

846. mephitis (Hew.)

Eudamus mephitis, Ann. Mag. Natl. Hist. XVIII, p. 349 (1876).

Sin.: dinora Ploetz, dinora Draudt (1922).

Tierras caliente y templado-cálida de Chiapas, Oaxaca (región del Istmo), Tabasco, Veracruz.

847. phalaecus (G. & S.)

Thymele phalaecus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II p. 314, T. 78, figs. 10, 11, 12. (1893).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

848. anaphus (Cram.)

Papilio anaphus, Pap. Exot. II. p. 126, T. 178, fig. F. (1779).

Sin.: anaphides Mab. & B.

Tierras templada y caliente de todo el Sur y por las dos costas hasta Sinaloa y el Sur de Tamaulipas.

849. alardus (Stoll).

Papilio alardus, Suppl. Cramer Pap. Exot. p. 171, T. 39, fig. 7 (1790).

Sin.: fabrici Ehrm.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

850. **chiriquensis** (Stgr.)
 Telegonus chiriquensis, Verh. Zool. bot. Ges. Wien XXV. p. 111 (1875).
 Sin.: meretrix Hew., weymeri Ploetz.
 Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.
851. **bifascia** (H. -S.)
 Eudamus bifascia, Corresp. Blatt, zool. min. Ver. Regensb. 23. p. 65 (1869).
 Tierra templada del interior de Chiapas. Hasta 2000 m. (San Cristóbal las Casas).
852. **creteus** (Cram.)
 a. **creteus hopfferi** (Ploetz).
 Eudamus hopfferi, Stett. Ent. Ztg. XXIV, p. 90 (1882).
 Tierras templada y caliente de Veracruz y partes colindantes; además en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Por el lado del Pacífico en la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Occidental hasta Sinaloa.
853. **ampyx** (G. & S.)
 Telegonus ampyx, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 306, T. 77, figs. 11, 12 (1893).
 Sin.: amphyx Mab.
 Península de Yucatán, Tabasco. (Tierra caliente).
854. **megalurus** (Mab.)
 Telegonus megalurus, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877).
 Sin.: consus G. & S.
 Por el lado del Pacífico en las Sierras Madres del Sur y Occidental hasta Nayarit. (Tierras caliente y templado-cálida).
855. **eudemus** (Mab.)
 Thymele eudemus, Le Natur. X. p. 170 (1888).
 Tierra caliente del Estado de Veracruz (Atoyac). No conozco esta especie. (? in hoc gen.)
856. **apastus** (Cram.)
 Papilio apastus, Pap. Exot. II. p. 22, T. 111, figs. D, E. (1779).
 Sin.: briccus Draudt 1922 T. 168 c. nec apastus Draudt 1922. T. 167 e., briccus Williams 1927 (nec Ploetz ?).
 Tierra caliente de Tabasco y Veracruz (Atoyac, Presidio).
- TELEMIANES Hbn.
857. **avitus** (Cram.)
 Papilio avitus, Pap. Exot. IV. p. 123 (1782).
 Tierras templada y caliente de Veracruz.
858. **megallus** Mab.
 Le Natur. X. p. 221, fig. 3 (1888).
 Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz y partes colindantes de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
859. **amphion** (Geyer).
 Proteides amphion, Zutr. Exot. Schmett. IV. fig. 631, 632 (1832).
 Sin.: zethos Ploetz, antiope Ploetz, compressa Moeschl.
 Tierras templada y caliente de Tabasco, Veracruz y partes colindantes.
860. **phasias** (Hew.)
 Eudamus phasias, Descr. Hesp. p. 17 (1867).
 Sin.: phassias Mab.
 Tierras templada y caliente de Veracruz.

AUTOCHTON Hbn.

861. *neis* (Geyer).

Cecrops neis, Zutr. Samml. Exot. Schm. IV. 10, figs. 619, 620 (1832).
 Sin.: *lunulus* Ploetz, *bocus* Ploetz, *integrifascia* Mab., *dhega* Mab., *reflexus* Mab. & Blt., *agathokles* Ehrm.
 Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). Chiapas. Por el lado del Pacífico en la costa y la Sierra Madre del Sur de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En la Sierra Madre Occidental hasta Sinaloa.

862. *aunus* (Fabr.)

Papilio aunus, Spec. Insect. II. p. 134 (1781).
 Sin.: *zarex* Hbn., *brontes* F., *longipennis* Ploetz, *orontes* Ploetz, *isokrates* Ehrm.
 Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Yucatán al Sur de Tamaulipas). Chiapas. Oaxaca (región del Istmo).

863. *bipunctatus* (Gmel.)

Papilio bipunctatus, Linn. Syst. Nat. edición 13, I, p. 2860 (1760).
 Tierra caliente de Tabasco, Sur de Veracruz.

864. *cincta* (Ploetz).

Cecropterus cincta, Berlin, Ent. Zeit. 26, p. 261 (1882).
 Sin.: *cinctus* G. & S.
 Tierras templada y templado-cálida de la Sierra Madre Oriental. Chiapas. Sierra Madre del Sur. Jalisco, Michoacán, Colima.

865. *capys* (G. & S.)

Cecropterus capys, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 330 (1894).
 Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

866. *vectilucis* (Btlr.)

Eudamus vectilucis, Lepid. Exot. p. 109, T. 40, fig. 6 (1872).
 Tierra caliente de la costa del Pacífico. (Sinaloa).

867. *cellus* (Bsd. & Lec.)

Eudamus cellus, Lep. Amer. Sept. T. 73 (1833).
 Sin.: *festus* Geyer.
 Tierras fría, templada y caliente de las montañas de la región del Pacífico (de Oaxaca a Sonora). Sierra Volcánica Transversal hasta unos 2500 metros. Cuenca del Río Balsas. Serranías de Puebla, Oaxaca y Veracruz.
 forma *mexicana* (Draudt).
Rhabdoides mexicana, Seitz, Gross-Schm. V. p. 871, T. 169 a. (1922).
 Tierra templada de Veracruz (Orizaba).

868. *pseudocellus* (Cool. & Clem.)

Achalarus pseudocellus, Ent. News XXII, p. 3 (1911).
 Sonora, Chihuahua; hacia el Sur hasta la tierra templada de Morelos. (No he visto ejemplares de la región intermedia).

BUNGALOTIS Wts.

869. *midas* (Cram.)

Papilio midas, Pap. Exot. p. 99, T. 63, fig. G. (1779).
 Sin.: *rhetus* F., *astylos* Cr., *quadratum* Sepp., *corentinus* Ploetz.
 Sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas. (Tierra caliente).

870. *dexo* (Mab.)

Telegonus dexo, Le Naturaliste X. p. 169, fig. 2. (1888).
 Tierra templado-cálida de Veracruz.

DYSCOPHELLUS G. & S.

871. **porcius** (Feld.)

Eudamus porcius, Wien. Ent. Mon. VI. p. 182 (1862).

Sin.: doricus Hew., coecutiens H. -S., sebalus Ww. & Hew. (nec Cram.)

Quintana Roo, Tabasco, Sur de Veracruz. (Tierra caliente).

NASCUS Wts.

872. **phocus** (Cram.)

Papilio phocus, Pap. Exot. II. p. 102. T. 162, fig. F. (1779).

Sin.: pherenice Hew., morphus Cr., decemmaculata Sepp.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

873. **mackeyi** Williams.

Trans. Amer. Ent. Soc. 59, p. 11. T. 1, figs. 5, 6, 7, 8. (1933).

Interior de Chiapas (San Cristóbal), tierra caliente del Sur de Veracruz (Presidio).

874. **euribates** (Cram.)

Papilio euribates, Pap. Exot. IV. p. 215, T. 393, fig. D. (1782).

Sin.: nicias Fabr., hesus Ww. & Hew., etias Hew., gaurus Ploetz.

No he visto ejemplares de México.

875. **cephisus** (Hew.)

Eudamus cephisus, Ann. Mag. Nat. Hist. 18, p. 351 (1876).

Sin.: gizala Mschl., evathlus Mab.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

876. **caepio** (H. -S.)

Telemiades caepio, Corr. Blatt Regensb. XXIII, p. 188 (1869).

Sin.: calpio Kaye, cepio Btlr., maneros Mab.

Chiapas (?).

877. **advena** (Mab.)

Telegonus advena, Le Naturaliste, XI, p. 59, fig. 1 (1889).

Tierras templado-cálida y caliente del Sur de Veracruz. Oaxaca (región del Istmo).

AETHILLA Hew.

878. **echina** Hew.

Equat. Lepid. p. 70 (1870).

Sin.: oeclydes Ploetz, oeclydes Mab. & V.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas. En la tierra caliente de la costa del Pacífico hasta Sinaloa.

879. **lavochrea** Btlr.

Lepid. Exot. T. 40, p. 110, fig. 4 (1874).

Sin.: athymnios Moeschl.

Tierra caliente de Veracruz, Tabasco.

THORYBES Scudd.

880. **mexicana** (H. -S.)

Eudamus mexicana, Prodr. Syst. Lep. p. 68 (1768).

Sin.: ananias Ploetz, mexicanus G. & S.

Tierras fría y templada (excepcionalmente en tierra caliente) de Sonora, Baja California, Sierra Madre Occidental, Mesa del Norte, Mesa Central, Colima, Jalisco, Sierra Volcánica Transversal (Valle de México, Valle de Puebla), Sierra Madre Oriental (Veracruz y partes colindantes), Cuenca del Río Balsas, Sierra Madre del Sur (Guerrero).

881. *pylades* (Scudd.)

Eudamus pylades, Proc. Boston Soc. Natl. Hist. XIII, p. 207 (1870).
 Sin.: bathyllus Harris (nec Abb. & Sm.), mexicana Wright (nec H. -S.)
 Tierras templada y fría de Sonora, Sierra Madre Occidental, Sierra Volcánica Transversal hasta más de 2500 metros (Valle de México, Sierra de Guadalupe).—Oaxaca (?).

882. *drusius* (Edw.)

Eudamus drusius, Canad. Ent. p. 211 (1883).
 Sin.: paucipuncta Dyar.
 Tierras templada y templado-cálida de Sonora, Sierra Madre Occidental, Colima, Jalisco, Michoacán (Uruapan), Sierra Madre del Sur (Guerrero).

883. *uvyidixa* Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 47, p. 367 (1915).
 Sierra Madre del Sur (Guerrero, Oaxaca).

884. *thedeia* Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 42, p. 43 (1912).
 Valle de Tehuacán, Serranías de la Mixteca.

CAICELLA Hem. (= Phoedinus G. & S.)

885. *caicus* (H. -S.)

Eudamus caicus, Corr. Blatt. Regensb. XXIII, p. 188 (1869).
 Sin.: schaefferi Ploetz, moschus Edw.
 Tierra templada de Sonora, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur, Montañas de Veracruz.

- 886. *aventinus* (G. & S.)

Phoedinus aventinus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 335 (1894).
 Tierras caliente y templado-cálida de la Sierra Madre del Sur (Guerrero), Cuenca inferior del Río Balsas.

887. *mysie* (Dyar.)

Thorybes mysie, Journ. N. York Ent. Soc. Vol. XII, p. 40 (1904).
 De Sonora a las montañas del Centro. Valle de México. Sube hasta alturas de unos 2500 metros o algo más.

COGIA Btlr.

888. *outis* (Skinn.)

Eudamus outis, Ent. News V, p. 332 (1894).
 Coahuila (?), Chihuahua.

889. *cajeta* (H. -S.)

Eudamus cajeta, Corr. Blatt. Regensb. XXIII, p. 188 (1869).
 Sin.: caieta Mab. & B.
 Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco. (Regiones húmedas).

a. *cajeta eluina* G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 339, T. 81, figs. 4, 5 (1893).
 Regiones secas y calientes de la Península de Yucatán, Hidalgo, Costa del Pacífico, Cuenca del Río Balsas.

890. *hippalus* (Edw.)

Eudamus hippalus, Papilio II, p. 27 (1882).
 Sin.: gila Ploetz.
 Tierras templada y caliente de Veracruz, Oaxaca (Región del Istmo), Valle de Tehuacán, Sierra Madre del Sur (Guerrero), Jalisco, Colima, Sierra Madre Occidental, Sonora.

891. **calchas** (H. -S.)

Eudamus calchas, Corresp. Blatt. Regensb. XXIII, p. 188 (1869).

Sin.: terranea Butl., anacreon Ploetz.

Tierras templada y caliente del Sur y por las 2 Costas hasta Tamaulipas y Colima. Cuenca del Río Balsas.

892. **valeriana** Ploetz.

Stett. Ent. Zeit. 43, p. 99 (1882).

Sin.: valerius Godm., valeria Draudt.

No conozco esta especie.

ACHALARUS Scudd.

893. **lyciades** (Geyer.)

Proteides lyciades, Zutr. Samml. exot. Schmett. IV. T. (108), figs. 621-622 (1826).

Sin.: lycidas Abb. & Sm. (nec Cram.), hedysarum Scudd.

Tierra templada de Veracruz (Orizaba).

894. **albociliatus** (Mab.)

Telegonus albociliatus, Pet. Nouv. Ent. II. p. 162 (1877).

Sin.: jalapus Ploetz, albociliata G. & S. (part.)

Tierra templada y caliente de la región del Golfo. Sierra Madre del Sur.

895. **coyote** (Skin.)

Eudamus coyote, Can. Ent. XXIV. p. 164 (1892).

Sin.: albociliatus Dyar 1905 (nec Mab.)

Chihuahua.

896. **toxeus** (Ploetz).

Aethilla toxus, Berlin. Ent. Zeit. XXVI, p. 258, (1882).

Sin.: albociliata var. nigrociliata Mab. & B., albociliata G. & S. (part.)

Tierras templada y caliente de Sinaloa, Durango, Colima, Jalisco, Cuenca del Río Balsas, Morelos, Sur de Puebla.

Nota: Predominan en todas partes los ejemplares con cilia de color blanco!

897. **tehuacana** (Drdt.)

Rhabdoides tehuacana, Seitz Gross-Schmett. V. p. 871, T. 169 b. (1922).

Valle de Tehuacán, Pue.; Mixteca.

898. **casica** (H. -S.)

Eudamus casica, Corr. Blatt. Regensb. XXIII, p. 187 (1869).

Sin.: epigena Butl., crestes Edw., epigona G. & S. (nec H. -S.)

Tierra templada de Veracruz, Valle de Tehuacán, Oaxaca, Sierra Madre del Sur, Michoacán (Uruapan).

CABARES Godm. & Salv.

899. **potrillo** (Lucas).

Thanaos potrillo, Sagra, Hist. fis. Cuba, p. 641 (1856) (Edic. franc.)

Sin.: poterillo H. -S.

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Yucatán al Norte de Veracruz). Por el lado del Pacífico en la Sierra Madre del Sur, Cuenca del Río Balsas, Michoacán (Uruapan), Jalisco, Colima.

900. **enops** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 338, T. 80, figs. 27, 28. (1894).

Tierras templada y caliente de Veracruz.

TYPHEDANUS Btlr.

901. **alladius** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 343, T. 81, figs. 7, 8, 9. (1894).

Tierras templada y templado-cálida de Veracruz, Cuenca del Río Balsas.

OCYBA Linds.

902. **calathana** (Hew.)

Caecina calathana, Descr. Hesp. p. 56 (1868).

Tierras caliente y templado-cálida de la Costa del Pacífico, de Chiapas (Tapachula) hasta Colima.

forma **calanus** (G. & S.)

Caecina calanus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 343, T. 81, figs. 10, 11, 12 (1894).

Sin.: calavius Mab.

Tierras caliente y templado-cálido de Veracruz, interior de Chiapas, Sierra Madre del Sur, Cuenca del Río Balsas. En Chiapas y la Región del Pacífico formas intermedias.

SPATHILEPIA Btlr.

903. **clonius** (Cram.)

Papilio clonius, Pap. Exot. I. p. 126. T. 80, figs. C, D. (1779).

Sin.: clonias Fabr.

Tierras templada y caliente de todo el Sur. Cuenca del Río Balsas. Por el lado del Golfo hasta el Sur de Tamaulipas, por el lado del Pacífico hasta Nayarit.

HYDRAENOMIA Btlr.

904. **orcinus** (Feld.)

Eudamus orcinus, Reise Novara Lep. II, p. 510, T. 71 (1867).

Sin.: albicuspis G. & S. (nec H. -S.)

Tierra caliente de Veracruz. Tierra caliente de la Costa del Pacífico (Acapulco).

905. **zelotes** (Hew.)

Eudamus zelotes, Exot. Butt. 5, End. I (1873).

Tierra caliente del Sur de Veracruz (Presidio).

PHANUS Hbn.

906. **vitreus** (Cram.)

Papilio vitreus, Pap. Exot. IV. p. 146 (1782).

Sin.: momus Fabr.

Tierras templada y caliente de la región del Golfo, de Veracruz a Yucatán. Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero).

Grupo B

ARTEUROTIA Btlr. & Drc.

907. **tractipennis** Btlr. & Drc.

Cist. Ent. I. p. 112 (1872).

Sin.: ribbei Stgr.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas.

PELLICIA H. -S.

908. *dimidiata* H. -S.

Corr. Blatt Regensb. 24, p. 160 (1870).

Sin.: *didia* Moeschl., *corinna* Ploetz, *bilinea* Mab.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Colima.

909. *ephora* H. -S.

Corr. Blatt Regensb. 24, p. 160 (1870).

Sin.: *rubescens* Moeschl., *perforata* Ploetz (nomen nudum), *tiphys* G. & S.
Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca (región del Istmo). Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero).

910. *macarius* H. -S.

Corr. Blatt Regensb. 24, p. 160 (1870).

Sin.: *macareus* G. & S.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Oaxaca (región del Istmo), Tabasco.

911. *castolus* (Hew.)

Arteurotia castolus, Ann. Mag. Nat. Hist (5), I, p. 347 (1878).

Sin.: *nyctineme* G. & S. (nec Btlr.)

Tierra caliente del Sur de Veracruz.

912. *bromias* G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 370, T. 83, figs. 13, 14, 15. (1894).

Tierras templada y caliente de la costa del Pacífico. Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero). Cuenca del Río Balsas. Michoacán (Uruapan). Colima. Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz y partes colindantes de San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca. Tabasco.

913. *costimacula* H. -S.

Corr. Blatt Regensb. 24, p. 160 (1870).

Sin.: *guilfordi* Weeks.

Tierras caliente y templado-cálida de la región costera de Guerrero y Oaxaca. Cuenca del Río Balsas. Península de Yucatán, Tabasco, Veracruz.

914. *licisca* Ploetz.

Berl. Ent. Zeit. XXVI, p. 254 (1882).

Sin.: *thyestes* G. & S., *melcheri* Weeks.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, partes colindantes de Oaxaca, Tabasco.

915. *polyctor* (Prittw.)

Pirgus polyctor, Stett. Ent. Zeit. 29, p. 186 (1868).

Sin.: *ithrana* Butl.

Tierras caliente y templado-cálida de Campeche, Tabasco y Veracruz. Por el lado del Pacífico de Guerrero a Colima.

TIMOCHREON G. & S.

916. *doria* (Ploetz).

Tagiades doria, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 37, p. 44 (1884).

"México". No he visto ejemplares mexicanos.

PACHES G. & S.

917. *loxus* (Westw. & Hew.)

Phareas loxus, Gen. Diurn. Lep. II, p. 516, T. 80 (1852).

Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz y partes colindantes de Oaxaca; Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Sur de Chiapas (Tlapachula).

918. *polla* (Mab.)

Pythonides polla, Le Natur. (2) X. p. 254, fig. (1888).

Tierra caliente de la región costera de Guerrero y Oaxaca. Vertientes de la Sierra Madre del Sur.

PYTHONIDES Hbn.

919. *proxenus* (G. & S.)

Ate proxenus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 401, T. 86, figs. 31, 32, 33 (1895).

Tierra templado-cálida del Sur de Veracruz y Tabasco.

920. *amaryllis* Stdg.

Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 25, p. 114 (1876).

Tierra caliente del Sur de Chiapas.

SOSTRATA G. & S.

921. *scintillans* (Mab.)

Leucochitonias scintillans, Bull. Soc. Ent. France (5), V. p. 200 (1876).

Sin.: *adamas* Ploetz (hembra).

Tierra caliente del Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Por el lado del Pacífico en las tierras caliente y templado-cálida de Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima. Interior de Chiapas.

QUADRUS Linds.

922. *cerialis* (Cram.)

Papilio cerialis, Pap. Exot. IV. p. 213, T. 392 (1782).

Sin.: *cerealis* Btlr., *orcus* Fabr. (nec Cram.), *cerberus* Hbn.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas. En la costa del Pacífico hasta Sinaloa.

923. *contubernalis* (Mab.)

Pythonides contubernalis, Bull. Soc. Ent. Belg. 27, p. 76 (1883).

Sin.: *praxis* Ploetz.

Tierra caliente del Sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

924. *anicus* (G. & S.)

Pythonides anicus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 360, T. 82, figs. 6, 7. (1894).

Tierra templado-cálida del Sur de Chiapas. (Soconusco).

925. *lugubris* (Feld.)

Leucochitonea lugubris, Verh. Zool. bot. Ges. Wien. 19. p. 476 (1869).

Sin.: *ophia* Btlr., *sephara* Hew., *cobarus* Moeschl., *ambla* Ploetz.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Valle de Tehuacán. Oaxaca. Cuenca del Río Balsas. Colima.

926. *hyacinthinus* (Mab.)

Telemiades hyacinthinus, Pet. Nouv. Ent. II. p. 165 (1877).

Sin.: *servius* Ploetz.

"México". No he visto ejemplares mexicanos.

927. *scybis* (G. & S.)

Pythonides scybis, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 363, T. 82, figs. 22, 23. (1894).

Tierras caliente y templada de Veracruz. Sierra Madre del Sur. Cuenca del Río Balsas. Colima.

928. *pelopea* (G. & S.)

Pythonides pelopea, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 363, T. 82, figs. 26, 27. (1894).

Sierra Madre Occidental (Nayarit).

929. **truncata** (Hew.)

α. **truncata obscurascens** (Mab. & B.)

Gindanes truncata var. obscurascens, Bull. Soc. Ent. France, p. 101 (1917).
"México". No he visto ejemplares mexicanos.

ZOPYRION G. & S.

930. **sandace** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 440, T. 90, figs. 8, 9, 10. (1896).

Tierra caliente de Oaxaca y Guerrero. (Costa y Vertientes de la Sierra Madre del Sur).

ATARNES G. & S.

931. **salléi** (Feld.)

Leucochitonea salléi, Reise Novara Zool. II. p. 525, T. 74, fig. 25 (1867).

Sin.: sallaei G. & S.

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). Por el lado del Pacífico hasta Colima. Cuenca del Río Balsas.

MYLON G. & S.

932. **lassia** (Hew.)

Leucochitonea lassia, Descr. Hesp. p. 49 (1868).

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo. Chiapas. Sierra Madre del Sur. Jalisco. Colima.

933. **pulcherius** (Feld.)

Leucochitonea pulcherius, Verh. zool. bot. Ges. Wien 19, p. 477 (1869).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco. Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero).

GRAIS G. & S.

934. **stigmaticus** (Mab.)

Anastrus stigmaticus, Bul. Soc. Ent. Belg. 27, p. 54 (1883).

Sin.: fumosus Ploetz.

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (Tamaulipas; Veracruz y partes colindantes de Oaxaca; Tabasco), Chiapas.

935. **choricus** Schs.

Graius (!) choricus, Proc. U. S. Natl. Mus. 24, p. 429 (1902).

Tierra caliente de Veracruz.

¿Forma fem. de stigmaticus?

EUDAMIDAS G. & S.

936. **melander** (Cram.)

Papilio melander, Pap. Exot. III. p. 141, T. 270 (1782).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

937. **ozema** (Butl.)

Achlyodes ozema, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 515 (1870).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco. Campeche, Yucatán, Chiapas. Por el lado del Pacífico hasta Colima.

ab. **brunnea** (Mab. & B.)

Mylon ozema ab. brunnea, Bull. Soc. Ent. France p. 55 (1917).

938. **jason** (Ehrm.)

Leucochitonea jason, Canad. Ent. 39, p. 317 (1907).

Tierras calientes y templado-cálida del Sur de Chiapas (Soconusco). Tierra caliente de las selvas de Campeche ("La Gloria").

XENOPHANES G. & S.

939. *tryxus* (Cram.)

Papilio tryxus, Pap. Exot. IV. p. 87, T. 334 (1782).

Sin.: *salvianus* Fabr., *euphemie* Ehrm.

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Tamaulipas a Yucatán). Chiapas. Oaxaca. Por el lado del Pacífico hasta Sinaloa.

GORGOPHONE G. & S.

940. *meliboea* G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 378, T. 84, figs. 13, 14. (1894).

Tierra templado-cálida del Sur de Chiapas.

OULEUS Linds.

941. *coeliginea* (Mab.)

Hesperia coeliginea, Bull. Soc. Ent. Belg. 27, p. 75 (1883).

Sin.: *caliginea* G. & S.

Tierra caliente de Veracruz, Tabasco.

942. *calavius* (G. & S.)

Achlyodes calavius, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 395, T. 86, figs. 11, 12. (1895).

Tierra templado-cálida del Sur de Chiapas (Soconusco).

943. *bubaris* (G. & S.)

Achlyodes bubaris, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 395, T. 86, figs. 13, 14. (1895).

Tierra templado-cálida de Veracruz, Chiapas.

ECHELATUS G. & S.

944. *varius* (Mab.)

Anastrus varius, Bull. Soc. Ent. Belg. 27, p. 54 (1883).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

945. *robigus* (Ploetz).

Antigonus robigus, Jahr. Nass. Ver. Nat. 37, p. 26 (1884).

Sin.: *luctuosus* G. & S.

Tierra caliente de la costa del Pacífico. (Guerrero).

946. *sempiternus* (Btl. & Drc.)

Achlyodes sempiternus, Cist. Ent. I, p. 114 (1872).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Por el lado del Pacífico en la costa y la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero.

DIAEUS G. & S.

947. *lacaena* (Hew.)

Leucochitonea lacaena, Illustr. Exot. Butt. (1869).

Tierra caliente de Veracruz.

ANTIGONUS Hbn.

948. *nearchus* (Latr.)

Hesperia nearchus, Humb. & Donpl. Obs. Zool. II, p. 135, T. 43, figs. 3, 4.

Sin.: *ustus* Hbn., *pausus* Warr., *hippalus* Fld., *sataspes* Fld.

Tierras templado-cálida y caliente de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). Por el lado del Pacífico de Chiapas a Guerrero.

949. **erosus** (Hbn.)

Urbanus vetus erosus, Samml. Exot. Schmett. T. 153 (1820).

Sin.: westermanni Latr., erosa G. & S.

Tierras templada y caliente de todo el Sur. Por el lado del Golfo hasta el Sur de Tamaulipas, por el lado del Pacífico hasta Sinaloa.

950. **funebis** (Feld.)

Leucochitonea funebris, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 19, p. 480 (1869).

Tierras templada y caliente de la Sierra Madre del Sur (Oaxaca y Guerrero). Cuenca del Río Balsas. Morelos. Tierra caliente de Veracruz.

951. **corrosus** Mab.

Pet. Nouv. Ent. II. p. 198 (1878).

Sin.: sericus Ploetz, corrosa G. & S.

Tierra caliente de Veracruz, Tabasco. En Chiapas sube hasta unos 1200 metros.

952. **pulverulenta** (Feld.)

Leucochitonea pulverulenta, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 19, p. 478 (1869).

Sin.: zampa Edw., taeniatum Ploetz.

Tierras templada y caliente de casi toda la República.

953. **microsticta** (Dyar.)

Systasea microsticta, Ins. Insc. Menstr. XI. p. 12 (1923).

Cuenca del Río Balsas. Valle de Tehuacán. (Tierra templada).

954. **emorsa** (Feld.)

Leucochitonea emorsa, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 19, p. 479 (1869).

Tierras templada y templado-cálida de la cuenca del Río Balsas. Vertientes de la Sierra Volcánica Transversal. Sierra Madre Occidental hasta Chihuahua. Sierra Madre del Sur.

forma **albimedia** (Draudt.)

Systasea albimedia, Seitz. Gross-Schmett. V. p. 904, T. 176 f. (1922).

Cuenca del Río Balsas, Sierra Madre del Sur (Guerrero), Vertiente Sur de la Sierra Volcánica Transversal (México, Michoacán).

TIMOCHARES G. & S.

955. **trifasciata** (Hew.)

Leucochitonea trifasciata, Descr. Hesp. p. 50 (1866).

Sin.: hemula G. & S., trifasciatus G. & S.

Tierra caliente de Veracruz, Tabasco, Campeche. Por el lado del Pacífico en la costa y las vertientes de las Sierras Madres de Oaxaca, Guerrero, Colima, Nayarit.

forma **obscurior** Draudt.

Seitz Gross-Schmett. V. p. 907, T. 173 i (1922).

956. **ruptifasciata** (Ploetz).

Antigonus ruptifasciata, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 37, p. 27 (1884).

Sin.: ruptifasciatus G. & S.

Tierras templado-cálida y caliente de Veracruz.

EBRIETAS G. & S.

957. **osyris** (Stdg.)

Achlyodes osyris, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 25, p. 114 (1876).

Tierra caliente del Sur de Veracruz, Tabasco.

958. **anacreon** (Stdg.)

Achlyodes (Helias ?) anacreon, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 25, p. 115 (1876).

Sin.: tortricinus Ploetz (macho), undulatus Ploetz (nec H. S.)

Tierras caliente y templado-cálida de la Región del Golfo (Veracruz a Yucatán). Por el lado del Pacífico en la Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero). Cuenca inferior del Río Balsas. Colima, Nayarit.

959. **ecliptica** (Btl.)

Achlyodes ecliptica, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 154 (1877).
Tierra caliente de Veracruz.

960. **lachesis** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 54, p. 338 (1918).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

CAMPTOPLEURA Mab.

961. **theramenes** Mab.

Pet. Nouv. Ent. II, p. 166 (1877).
Sin.: auxo Moeschl.
Tierra caliente de Veracruz.

962. **thrasibulus** (Fabr.)

Hesperia thrasibulus, Ent. Syst. III (1) p. 346 (1793).
Sin.: thrasylulus Latr.
Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). Por el lado del Pacífico de Chiapas a Sinaloa. Cuenca del Río Balsas.

CARRHENES G. & S.

963. **fuscescens** (Mab.)

Leucochitonea fuscescens, Bull. Soc. Ent. Belg. 35, p. 61 (1891).
Tierra caliente de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

964. **calidius** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 389, T. 85, figs. 22, 23. (1895).
Tierra caliente de Veracruz.

965. **callipetes** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 390, T. 85, figs. 24, 25, 26. (1895).
Tierras templada y templado-cálida de Veracruz.

966. **canescens** (Feld.)

Leucochitonea canescens, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, XIX, p. 476 (1869).
Tierras templada y caliente de Veracruz, Oaxaca (región del Istmo), Chiapas; costa y Sierra Madre del Sur (Guerrero), Jalisco, Colima. (Hasta unos 1200 metros sobre el nivel del mar).

ONENSES G. & S.

967. **hyalophora** (Feld.)

Leucochitonea hyalophora, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 19, p. 477 (1869).
Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca (región del Istmo).

ANASTRUS Hbn.

968. **necaris** (Moeschl.)

Achlyodes necaris, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 28, p. 226 (1879).
Sin.: obscurus Btl. & Dr. (nec Hbn.), corbulo Linds. (nec Cram.)
Tierras caliente y templado-cálida de la región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). Costa del Pacífico (Guerrero).

CYCLOSEMIA Mab.

969. **anastomosis** Mab.

Pet. Nouv. Ent. II. p. 230 (1878).

Sin.: *lyrcaea* Hew.

Tierras templado-cálida y caliente de Veracruz.

970. **phidyle** Godm. & Salv.

Biol. Centr. Amer. Lep. Rhop. II. p. 376, T. 84, figs. 7, 8. (1894).

Montañas del Oriente de Chiapas.

DOBERES G. & S.

971. **hewitsonius** (Reak.)

Achlyodes hewitsonius, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. XVIII. p. 340 (1866).

Sin.: *mexicana* Feld., *mexicanus* G. & S.

Tierras templada y fría de Veracruz, Puebla, Morelos, Distrito Federal, Hidalgo, México.

MASICES G. & S.

972. **anticus** (Ploetz).

Achlyodes anticus, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 37, p. 16 (1884).

Tierras templada y caliente de Veracruz.

a. **anticus sobrinus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 408 (1895).

Sierra Madre del Sur.

CELAENORRHINUS Hbn.

973. **eligius** (Cram.)

Papilio eligius, Pap. Exot. IV. p. 123, T. 354 (1782).

Sin.: *hiera* Ploetz.

Tierra templada de Veracruz. Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero).

974. **fritzgaertneri** (Bailey).

Pleusioneura fritzgaertneri, Bull. Ent. Soc. Brooklyn III, p. 62 (1880).

Sin.: *variegatus* G. & S.

Tierras templada y caliente de la Región del Pacífico (de Chiapas a Colima y Nayarit), Cuenca del Río Balsas. Morelos, Sur de Puebla, Veracruz.

975. **monartus** (Ploetz).

Tagiades monartus, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 37, p. 49 (1884).

Sin.: *chiriquensis* Mab.

Tierra caliente de Veracruz, Tabasco.

ACHLYODES Hbn.

976. **busirus** (Cram.)

Papilio busirus, Pap. Exot. T. 261, figs. A, B, C. (1782).

Sin.: *sebalus* F., *busiris* Hbn.

Tierras templado-cálida y caliente de la Región del Golfo (Veracruz, Tabasco, Campeche). Chiapas. Oaxaca (Región del Istmo). Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero). Jalisco. Colima.

977. **thraso** (Hbn.)

Urbanus vetus thraso, Samml. Exot. Schmett. I, T. 151, figs. 1, 2, 3, 4. (1807).

Sin.: *tamenund* Edw.

Tierras templado-cálida y caliente de toda la región del Golfo (de Tamaulipas a Yucatán). Quintana Roo. Chiapas. Nuevo León. Oaxaca (región del Istmo). Toda la Sierra Madre del Sur. En la región del Pacífico hasta Sinaloa.

987. **philetas** Edw.

Papilio I, p. 46, (1881).

Sierra Madre Occidental (hasta Jalisco).

988. **communis** (Grote).

Syrichthus communis, Can. Ent. IV. p. 69 (1872).

Sin.: tessellata Scudd. (nec Hew.); albovittata Grote; montivaga Scudd. (nec Reak.), centaureae Comst. (nec Rambur).

α. **communis albescens** (Ploetz).

Mit. Nat. Ver. Vorpomm. 15, p. 4 (1884).

Sin.: adjutrix Ploetz, varus Ploetz, montivaga G. & S. (nec Reak.), occidentalis Skin.

En toda la República.

989. **domicella** Erichs.

Schomb. Reise in British Guiana III, p. 604 (1848).

Sin.: nearchus Edw., willi Ploetz, aconita Ploetz.

Hidalgo (Actopan), Guerrero (costa y vertientes de la Sierra Madre del Sur).

Se trata de regiones secas !

HELIOPETES Billb.

990. **ericetorum** Bsd.

Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 313 (1852).

Sin.: alba Edw.

Región Noroeste hasta Guerrero.

991. **laviana** (Hew.)

Leucochitonea laviana, Descr. Hesp. p. 48 (1868).

Sin.: pastor Feld.

Repartido sobre casi toda la República, desde la costa hasta alturas de unos 2300 metros sobre el nivel del mar (Valle de México).

992. **macaira** (Reak.)

Pyrgus macaira, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 18, p. 334 (1866).

Sin.: oceanus Edw., locutia Hew., cnemus G. & S.

Casi en toda la República.

forma **nivella** (Mab.)

Leucochitonea nivella, Ann. Soc. Ent. Belg. 27, C, rand. p. 55 (1883).

Sin.: nivea Scudd., orbiger a Mab., eulalia Ploetz.

993. **alana** (Reak.)

Pyrgus alana, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. p. 90 (1864).

Sin.: adusta Ploetz.

Tierras caliente y templada de todo el Sur del país. En la Sierra Volcánica Transversal sube a alturas de unos 2000 metros.

994. **arsalte** (L.)

Papilio arsalte, Mus. Ulr. p. 246.

Tierras caliente y templado-cálida de las regiones más bien húmedas del Sur y de las 2 Costas hasta Sinaloa y el Sur de Tamaulipas.

CELOTES G. & S.

995. **nessus** (Edw.)

Pholisora nessus, Can. Ent. IX, p. 192 (1877).

Sin.: notabilis Streck., radiatus Ploetz.

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila. Sube a alturas de más de 2000 metros sobre el nivel del mar.

PHOLISORA Scudd.

996. **catullus** (Fabr.)
Hesperia catullus, Ent. Syst. III. p. 348 (1793).
Baja California, Sonora, Chihuahua.
997. **mejicanus** (Reak.)
Nisoniades mejicanus, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 18, p. 334 (1866).
Sin.: mexicana G. & S.
Región Noroeste hasta Baja California. Mesa Central. Sierra Volcánica Transversal (hasta unos 2500 metros). Valle de México, Valle de Puebla, Valle de Tehuacán. Michoacán. Jalisco. Veracruz. Cuenca superior del Río Balsas. Morelos.
998. **smodora** Dyar.
Proc. U. S. Natl. Mus. 47, p. 367 (1914).
Sierra Madre del Sur (Guerrero). Oaxaca.
999. **clytius** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 442, T. 90, fig. 15 (1897).
Islas Tres Marías.
1000. **alpheus** Edw.
Trans. Amer. Ent. Soc. V. p. 206 (1876).
Sin.: cricus Edw., arizonensis Mab. & B.
Parte Occidental de la Mesa del Norte y de la Mesa Central.
1001. **libya** (Scudd.)
Heteropterus libya, Bull. Geol. Surv. Terr. IV. p. 258 (1878).
Baja California, Sonora.
1002. **mazans** (Reak.)
Carcharodus mazans, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 18. p. 335 (1866).
Sin.: ascalaphus Staudg., perforata Mschl., plummertini Weeks.
Tierras templada y caliente de todo el Sur de la República. Por el lado del Pacífico hasta Sinaloa, por el lado del Golfo hasta Tamaulipas.
1003. **hayhurstii** (Edw.)
Hesperia hayhurstii, Trans. Amer. Ent. Soc. III. p. 22 (1870).
Mesa del Norte.
1004. **azteca** Scudd.
Rep. Peab. Acad. Sci. p. 72 (1871).
Sin.: aztecus G. & S., quadratus Dyar (hembra) ?.
Tierras caliente y templada de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Valle de Tehuacán.—Por el lado del Pacífico hasta Colima.
1005. **semitincta** (Dyar.)
Bolla semitincta, Ins. Insc. Menstr. XII. p. 15 (1924).
Colima.
1006. **iguala** Wills. & Bell.
Trans. Amer. Ent. Soc. 66, p. 137, fig. 17 (1940).
Sierra Madre del Sur (Guerrero), Cuenca del Río Balsas, Jalisco, Colima.
(Tierras templada y templado-cálida).

1007. **giselus** (Mab.)
Hesperia giselus, Bull. Soc. Ent. Belg. 27. p. 75 (1883).
Sin.: eusebius Ploetz.
Tierra templada de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Guerrero). Jalisco, Colima.
1008. **aplica** Bell.
Amer. Mus. Nov. N° 914, pág. 13, fig. 15. (1937).
Sierra Madre del Sur (Guerrero).—Tierra templada.
1009. **evippe** (G. & S.)
Staphylus evippe, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 433, T. 89, figs. 19, 20 (1896).
Cuenca del Río Balsas. Morelos. (Tierra templada).
1010. **chilpancingo** Bell.
Amer. Mus. Nov. N° 914, p. 11, fig. 17 (1937).
Cuenca del Río Balsas. Sierra Madre del Sur (Guerrero). Tierras caliente y templada.
1011. **orsines** (G. & S.)
Staphylus orsines, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 434, T. 89, figs. 21, 22 (1896).
Jalisco. (Tierra templada).
1012. **holaphegges** (Dyar.)
Staphylus holaphegges, Proc. U. S. Natl. Mus. 44. p. 281 (1913).
Sin.: holophegges Draudt.
Tierra caliente de Veracruz.
1013. **bistor** (Dyar.)
Bolla bistor, Ins. Insc. Menstr. XIV, p. 141 (1926).
Tierra caliente de la región costera de Guerrero. (Acapulco).
1014. **litus** (Dyar.)
Staphylus litus, Proc. U. S. Natl. Mus. 42, p. 44 (1912).
Sierra Madre del Sur (Guerrero); Cuenca del Río Balsas. (Tierra caliente y templada), Sur de Puebla.
1015. **subapicatus** (Schs.)
Staphylus subapicatus Schs., Proc. U. S. Natl. Mus. p. 433 (1902).
Montañas de Veracruz (Songolica).
1016. **cylindus** (G. & S.)
Staphylus cylindus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 430, T. 89, figs. 1, 2, 3. (1895).
Tierra templada de Veracruz.
1017. **imbras** (G. & S.)
Staphylus imbras, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 435, T. 89, figs. 27, 28, 29. (1896).
Tierras caliente y templada de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero).
1018. **unifascia** (Mab.)
Antigonus unifascia, Le Naturaliste, p. 239 (1889).
Tierras templada y templado-cálida de Veracruz.

1019. **cupreiceps** (Mab.)

Antigonus cupreiceps, C. rend. Soc. Ent. Belg. p. 63 (1891).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero).

1020. **aurocapilla** (Stgr.)

Helias aurocapilla, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 25. p. 117 (1876).

Sin.: *vulgata* Mschl.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

1021. **ceos** Edw.

Papilio II. p. 140. (1882).

Sonora, Chihuahua, Durango.

CHIAMARA Godm. & Salv.

1022. **asychis** (Cram.)

Papilio asychis, Pap. exot. IV. p. 87, T. 334, figs. E. F. (1782).

Sin.: *georgina* Reak., *dilucida* Ploetz (nec Mschl.), *pelagica* Weeks.

En todo el Sur y Centro de la República. Sube a más de 2200 m. (Valle de México). Por el lado del Pacífico hasta Sonora y Baja California. Por el lado del Golfo hasta Tamaulipas y Nuevo León.

1023. **mithrax** (Mschl.)

Achlyodes mithrax, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 225 (1876).

Sin.: *noctula* Ploetz.

Tierras templada y caliente de la Región del Pacífico hasta Colima. Cuenca del Río Balsas. Chiapas, Campeche.

ERYNNIS Schr.

1024. **lacustra** (Wright)

Nisoniades lacustra, Butt. West Coast p. 253, T. 32 fig. 480 (1905).

Sin.: *callidus* Skin. & Wils. (nec Grinnell).

Baja California (Norte).

1025. **muelleri** (Draudt.)

Thanaos muelleri, Seitz Gross-Schmett. V. p. 917, T. 178 i. (1923).

Tierra fría de la región del Pico de Orizaba. (Esperanza, Pue.)—No conozco esta especie.

1026. **mercurius** (Dyar.)

Thanaos mercurius, Ins. Insc. Menstr. XIV. p. 141 (1926).

Valle de México.

1027. **gesta** (H. -S.)

Thanaos gesta, Corr. Blatt. Regensb. 17, p. 142 (1863).

Sin.: *invisus* Btl. & Drc., *blanda* Ploetz, *llano* Dodge.

Tierras templada y caliente de todo el Sur y por las 2 costas hasta Sonora y Tamaulipas. Cuenca del Río Balsas.

1028. **afranius** (Lintn.)

Nisoniades afranius, 30th. Rept. N. Y. State Mus. Nat. Hist. 1876, p. 175 (1878).

Sonora, Baja California (Norte).

1029. **propertius** (Scudd. & Burg.)

Nisoniades propertius, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 13, p. 298, fig. 11 (1870).

Sin.: *tibullus* Scudd. & Burg., *juvenalis* Wright. (nec Fabr.), *tristis* Wright (nec Bsd.) macho.

Baja California.

1030. **pacuvius** (Linn.)
 Nisoniades pacuvius, 30th. Rept. N. York State Mus. Nat. Hist. 1876, p. 172 (1878).
 Sonora (?).
1031. **scudderi** (Skinn.)
 Thanaos scudderi, Trans. Amer. Ent. Soc. 40, p. 215, (1914).
 Sin.: pacuvius G. & S. (nec Linn.)
 Sonora. Sierra Madre Occidental (hasta Jalisco). Sierra Volcánica Transversal (Valle de México). Sierra Madre del Sur (Guerrero). Hasta alturas de unos 3000 metros sobre el nivel del mar.
1032. **clitus** (Edw.)
 Thanaos clitus, Papilio II. p. 180 (1882).
 Sin.: maestus G. & S.
 Sonora. Colima. Michoacán (Uruapan). Valle de Puebla (La Malinche, El Pinal).—Hasta alturas de unos 2300 metros sobre el nivel del mar.
1033. **tristis** Boisd.
 Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 311 (1852).
 Sin.: tatus Edw.
 Región Noroeste.
1034. **funeralis** (Scud. & Burg.)
 Nisoniades funeralis, Proc. Bost. Nat. Hist. 13, p. 293, fig. 7 (1870).
 Sin.: clericalis Burm., australis Mab., clitus Wright (nec Edw.)
 Tierras templada y caliente de casi toda la República. Sube a alturas de unos 2300 metros sobre el nivel del mar.
1035. **albomarginatus** (G. & S.)
 Thanaos albomarginatus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 458, T. 91, figs. 19, 20, 21.
 Sin.: tristis Stdg. (nec Boisd.)
 Tierra templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

Subfamilia Hesperinae

Grupo A

BUTLERIA Kirby.

1036. **microsticta** G. & S.
 Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 464; T. 92, figs. 1-3 (1900).
 Sin.: aea Dyar, penaea Dyar.
 Tierra templada de la Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero), Jalisco, Michoacán. Cuenca del Río Balsas. Morelos.
1037. **gyrans** (Ploetz).
 Cyclopidides gyrans, Stett. Ent. Zeit. 45, p. 393 (1884).
 Sin.: anemala Mab.
 Tierras templada y fría de Jalisco, Sierra Madre del Sur (Guerrero), Sierra Volcánica Transversal, Valle de México. Sierra de Guadalupe. (Hasta unos 3000 metros sobre el nivel del mar).
1038. **ceracates** (Hew.)
 Cyclopidides ceracates, Exot. Butt. Cyclop. figs. 6. 7.
 Tierra fría de la Sierra Volcánica Transversal. Valle de México.
1039. **cyclosticta** Dyar.
 Ins. Insc. Menstr. VIII, p. 187 (1920).
 Valle de México.

1040. **brunnea** (Scudd.)
Ancyloxypha brunnea, Rep. Peabody Acad. Sci. p. 74 (1872).
 Tierras templada y fría de la Sierra Madre del Sur (Guerrero). Valle de México.
1041. **polingii** (Barnes).
Pyrgus polingii, Canad. Ent. XXXII, p. 44 (1900).
 Sierra Madre Occidental. Sierra Madre del Sur, Sierra Volcánica Transversal. Valle de México. Valle de Puebla. (Preferentemente en tierra fría).
1042. **lalage** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 466, T. 32, figs. 12, 13. (1900).
 Tierra templada de la Sierra Madre del Sur (Guerrero).
1043. **faula** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 466, T. 62, figs. 16, 17. (1900).
 Jalisco (Guadalajara), Sierra Madre del Sur (Guerrero).
1044. **bubobon** Dyar.
Ins. Insc. Menstr. IX, p. 137 (1921).
 Sierra Madre del Sur (Guerrero).

ARGOPTERON Wts.

1045. **dividuum** Dyar.
Proc. U. S. Natl. Mus. 44, p. 281 (1913).
 Tierras templada y templado-cálida de la Cuenca del Río Balsas. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

DARDARINA Evans.

1046. **dardaris** (Hew.)
Cyclopides dardaris, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XX, p. 328.
 Tierras templada y caliente de la Sierra Madre del Sur (Guerrero). Jalisco. Cuenca del Río Balsas. Morelos.

Grupo B

OARISMA Scudd.

1047. **garita** (Reak.)
Hesperia garita, Proc. Ent. Soc. Philad. VI, p. 150 (1866).
 Sin.: *hylax* Edw., *powesheik* G. & S. (nec Parker), *lena* Wright (nec Edw.)
 Sonora, Sierra Madre Occidental, Sierra Volcánica Transversal, Valle de México, Valle de Puebla, Sierra Madre del Sur (Guerrero).
1048. **edwardsii** (Barnes).
Thymelicus edwardsii, Can. Ent. XXIX, p. 42 (1897).
 Sin.: *garita* G. & S. (nec Reak.), *garita* Draudt (nec Reak.)
 Sonora, Chihuahua, Durango.
1049. **era** Dyar.
Pan Pacific Ent. IV, p. 7 (1927).
 Sierra Volcánica Transversal (Michoacán).

ADOPAEOIDES G. & S.

1050. **simplex** (Feld.)
Ancyloxypha simplex, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 476 (1869).
 Sin.: *ptrittwitzi* Ploetz, *bistriata* G. & S.

Durango, Jalisco, Sierra Volcánica Transversal, Valle de México, Valle de Puebla, Sierra Madre del Sur (Guerrero), Veracruz (tierra caliente a tierra fría).

ANCYLOXYPHA Feld.

1051. **arene** (Edw.)

Heteropterus arene, Trans. Amer. Ent. Soc. 3, p. 214 (1871).

Sin.: myrtis Edw., leporina Ploetz, euphrasia Ploetz.

En toda la República.

COPAEODES Speyer.

1052. **aurantiaca** (Hew.)

Ancyloxipha aurantiaca, Descr. Hesp. p. 45 (1868).

Sin.: waco Edw., procris Edw. (macho I), macra Ploetz, singularis Ploetz (nec H. -S.), candida Wgt., nanus Wats. (nec H. -S.)

En toda la República.

1053. **minima** (Edw.)

Hesperia minima, Trans. Amer. Ent. Soc. III, p. 196 (1870).

Sin.: procris Edw. (hembra), aurantiaca G. & S. (nec Hew.), rayata B. & McD.

En toda la República.

PSEUDOCOPAEODES Skin. & Wms.

1054. **eunus** (Edw.)

Copaeodes eunus, Papilio I, p. 47 (1881).

Sin.: wrightii Edw.

Baja California (Norte).

YVRETTA Hem.

1055. **citrus** (Mab.)

Pamphila citrus, Le Naturaliste, p. 144, fig. 1 (1888).

Tierras templada y caliente de la Región del Pacífico (de Chiapas a Sinaloa). Sierra Volcánica Transversal (Valle de México). Cuenca del Río Balsas.—Mesa Central, Montañas de Veracruz. Sube a unos 2300 metros o algo más.

1056. **rhesus** (Edw.)

Pamphila rhesus, Field & Forest, III, p. 116 (1878).

Sin.: axius Ploetz, subreticulata Ploetz.

Sonora, Sierra Madre Occidental (Durango). Montañas del Centro (hasta unos 3300 metros). Valle de México.

1057. **carus** (Edw.)

Pamphila carus, Can. Ent. 15, p. 34 (1883).

Tierras caliente y templado-cálida de la Cuenca del Río Balsas.—Costa del Pacífico (Guerrero). Chihuahua.

HYLEPHILA Billb.

1058. **phylaeus** (Dru.)

Papilio phylaeus, III. Exot. Ent. I, p. 25, T. 13, figs. 4, 5. (1770).

Sin.: colon Fabr., phareus Panzer, augias Hbn. (nec L.), carin Hbn., bucephalus Steph., hala Btl., ancora Ploetz, brettus Holl. (nec Bsd. & Lec.), brettus Wright (nec Bsd. & Lec.), brettoides Wright (nec Edw.)

En toda la República.

HESPERIA Fabr.

1059. **colorado** (Scudd.)

Pamphila colorado, Mem. Bost. Soc. Natl. Hist. II. p. 349, T. 10, figs. 16, 17, 18, T. 11, figs. 1, 2 (1874).

forma **leussleri** Linds.

Ann. Ent. Soc. Amer. 33, p. 373 (1940).

Baja California (Norte).

1060. **pahaska** Leussl.

Ent. News 49, p. 5 (1938).

forma **williamsi** Linds.

Trans. Ent. Soc. Amer. 33, p. 375 (1940).

Norte de Sonora.

1061. **columbia** (Scudd.)

Pamphila columbia, Rept. Peabody Acad. Sci. 1871, p. 77 (56) (1872).

Sin.: *california* Wgt., *erynnioides* Dyar, *sylvanoides* Scudd. (nec Bsd.)

Baja California (Norte).

1062. **viridis** (Edw.)

Pamphila viridis, Can. Ent. 15, p. 147 (1883).

Baja California (Norte) (?).

ATALOPEDES Scudd.

1063. **campestris** (Bsd.)

Hesperia campestris, Ann. Soc. Ent. France, (2) X. p. 313 (1852).

Sin.: *sylvanoides* Bsd. (hembra !), *huron* Edw., *kedema* Btl., *amphissa* Ploetz.

En toda la República.

POLITES Scudd.

1064. **sabuleti** (Bsd.)

Hesperia sabuleti, Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 316 (1852).

Sin.: *genoa* Ploetz.

Sonora, Baja California (Norte).

1065. **vibex** (Geyer).

Thymelicus vibex, Zutr. Samml. exot. Schmett. IV, T. (118), figs. 685, 683 (1826).

Sin.: *praeceps* Scudd., *golenia* Moeschl., *lumida* Moeschl., *zenckei* Ploetz, *combinata* Ploetz, *stigma* Skin., *hypozonea* Dyar.

Casi en toda la República.

1066. **athenion** (Hbn.)

Talides athenion, Samml. Exot. Schmett. T. 148, figs. 1, 2, 3, 4 (1816).

Tierras templada y caliente de todo el Sur y por las 2 costas hasta Sinaloa y el Sur de Tamaulipas.

WALLENGRENIA Berg.

1067. **otho** (Abb. & Sm.)

Papilio otho, Lep. Ins. Georgia I, p. 31, T. 16 (1797).

Sin.: *pustula* Geyer, *druryi* Latr., *jobrea* Dyar.

Tierras templada y caliente de la Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero), Jalisco, Colima, Michoacán. En la región del Golfo, de Tamaulipas a Yucatán.

OCHLODES Scudd.

1068. **nemorum** (Bsd.)

Hesperia nemorum, Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 314. (1852).
Sin.: pratincola Bsd. (macho), milo Draudt (nec Edw.)
Baja California.

1069. **sylvanoides** (Bsd.)

Hesperia sylvanoides, Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 313 (1852).
Sin.: pratincola Bsd. (hembra), agricola Ploetz (nec Bsd.), francisca Ploetz,
nemorum Wright (nec Bsd.), agricola Wright (nec Bsd.), milo Wright (nec
Edw.), pratincola Wright (nec Bsd.), agricola Draudt (nec Bsd.)
Baja California.

1070. **agricola** (Bsd.)

Hesperia agricola, Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 314 (1852).
Sin.: yreka Edw., verus Edw., milo Edw., nemorum Skin. (nec Bsd.), pratin-
cola Wright (nec Bsd.), nemorum Draudt (nec Bsd.)
Baja California.

1071. **snowi** (Edw.)

Pamphila snowi, Can. Ent. IX. p. 29 (1877).
Sierra Madre Occidental hasta Sonora. Montañas del Centro, Valle de Mé-
xico, Valle de Puebla. Preferentemente en tierra fría.

1072. **samenta** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus., 47, p. 367. (1914).
Sierra Madre del Sur (Guerrero), Jalisco. (Tierra templada).

1073. **morrisoni** (Edw.)

Pamphila morrisoni, Field & Forest, III, p. 116 (1878).
Sonora.

1074. **heras** (G. & S.)

Augiades heras, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 484, T. 93, figs. 24, 25, 26.
(1900).
Sierra Madre del Sur (Guerrero).

1075. **librita** (Ploetz).

Hesperia librita, Exot. Schmett. 20. Hesp. T. 1453.
Sin.: hecale G. & S.
Tierras caliente y templada de Veracruz, Chiapas. Sierra Madre del Sur
(hasta Guerrero). En la región del Pacífico sube a unos 2500 metros sobre
el nivel del mar.

ZARIASPES G. & S.

1076. **mys** (Hbn.)

Urbanus vigilans mys, Exot. Schmett. T. 158, figs. 1, 2 (1816).
Sin.: dukolum Blake, epictetus Star. (nec Fabr.)
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

1077. **mythecus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 488, T. 93, figs. 33-34. (1900).
Sin.: chromis Skinn.
Tierras caliente y templado-cálida de la Sierra Madre del Sur y la costa de
Guerrero. Jalisco, Colima.

POANOPSIS G. & S.

1078. *puxillius* (Mab.)

Pamphila puxillius, C. rend. Soc. Ent. Belg. p. 170 (1891).

Sierra Madre Occidental (Durango a Jalisco). Sierra Volcánica Transversal. Valle de México. Sierra Madre del Sur (Guerrero). Preferentemente en tierra fría.

POANES Scudd.

1079. *rhexenor* (G. & S.)

Paratrytone rhexenor, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 488, T. 93, figs. 41, 42, 43 (1900).

Sierra Madre Occidental. Sierra Madre Oriental (Veracruz).—Tierra fría.

1080. *polyclea* (G. & S.)

Paratrytone polyclea, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 488, T. 93, figs. 44, 45 (1900).

Sierra Madre del Sur (Omitlán, Gro.)

1081. *aphractoia* (Dyar.)

Paratrytone aphractoia, Proc. U. S. Natl. Mus. 47, p. 366 (1914).

Montañas altas del Centro, entre 2200 y 4200 metros sobre el nivel del mar. Valle de México, Popocatepetl, Ajusco.

1082. *melane* (Edw.)

Hesperia melane, Trans. Am. Ent. Soc. II. p. 312 (1869).

Sin.: *vitellina* H. -S.

Tierras templada y fría de la Sierra Madre Occidental, Sonora, Baja California.—Mesa Central. Michoacán, Colima, Jalisco. Sierra Volcánica Transversal. Valle de México, Valle de Puebla, Valle de Tehuacán. Montañas de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero).

1083. *zabulon* (Bsd. & Lec.)

Hesperia zabulon Lep. Amer. Sept. T. 76, figs. 6, 7 (1833).

Sin.: *erratica* Ploetz, *ogeechensis* Scudd., *pocahontas* Holland (nec Scudd.)

Tierras templada y fría de la Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero). Michoacán, Jalisco, Cuenca del Río Balsas. Valle de Puebla. Montañas de Veracruz y Chiapas.

1084. *psaumis* (G. & S.)

Phyoanassa psaumis, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 489, T. 94, figs. 2, 3. (1900).

Jalisco.

ATRYTONE Scudd.

1085. *logan* (Edw.)

Hesperia logan, Proc. Ent. Soc. Philad. II, p. 18, T. 1, fig. 5 (1863).

Sin.: *delaware* Edw., *jowa* Ploetz (nec Scudd.)

Sierra Madre del Sur. (Guerrero).

1086. *mella* G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 492, T. 94, figs. 14, 15, 16. (1900).

Tierra caliente de Veracruz.

1087. *xanthopolys* Dyar.

Ins. Insc. Menstr. XIV, p. 142 (1926).

Colima.

1088. **eulogius** (Ploetz).

Hesperia eulogius, Exot. Schmett. 20, Hesp. T. 608.

Sin.: mellona G. & S.

Tierras caliente y templada de Veracruz, Tabasco. Península de Yucatán.
Por el lado del Pacífico de Chiapas a Sinaloa.

1089. **myron** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 492, T. 94, figs. 20, 21, 22 (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

1090. **helva** (Mschlr.)

Pamphila helva, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 336 (1876).

Sin.: sethos Mab.

Tierra templada de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

1091. **gala** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 492, T. 94, figs. 35, 36. (1900).

Montañas de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

1092. **monticola** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 495, T. 94, figs. 37, 38, 39, 40 (1900).

Tierra fría de la Mesa Central y de las Montañas del Centro. Entre 2500 y 3500 metros sobre el nivel del mar.

1093. **ulphila** (Ploetz).

Exot. Schmett. 20. Hesp., T. 679.

"México". No conozco esta especie.

1094. **inimica** (Btl. & Drc.)

Pamphila inimica, Cist. Ent. I. p. 114.

Sin.: lupulina Ploetz.

Tierra templada de Veracruz, Chiapas.

1095. **ruricola** (Bdv.)

Hesperia ruricola, Ann. Soc. Ent. France (2) X, p. 317 (1852).

Sin.: vestris Bdv., metacomet Harr., rurea Edw., kiowah Reak., osyka Edw.,
osceola Lint., californica Mab.

Baja California.

ATRYTONOPSIS G. & S.

1096. **deva** (Edw.)

Hesperia deva, Trans. Amer. Ent. Soc. V. p. 292 (1876).

De Sonora hasta las montañas de Guerrero.

1097. **python** (Edw.)

Pamphila python, Papilio II, p. 139 (1882).

Sonora.

1098. **cestus** (Edw.)

Pamphila cestus, Papilio IV. p. 57 (1884).

Sonora. (?)

1099. **pittacus** (Edw.)

Pamphila pittacus, Papilio II. p. 138 (1882).

Sonora.

AMBLYSCIRTES Scudd.

1100. **exoteria** (H. -S.)
Goniloba exoteria, Corr. Blatt. Regensb. 23, p. 196 (1869).
Sin.: nanno Edw.
Sonora. Sierra Madre Occidental hasta Jalisco. Tierra templada de Veracruz.
1101. **tutolia** Dyar.
Proc. U. S. Natl. Mus. 44, p. 281 (1913).
Sierra Madre del Sur (Guerrero).
1102. **catahoma** Dyar.
Proc. U. S. Natl. Mus. 51, p. 4 (1916).
Sierra Madre del Sur (Guerrero). Cuenca del Río Balsas. (Tierras templado-cálida y templada).
1103. **folia** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 504, T. 95, figs. 35, 36. (1900).
Sierra Madre del Sur (Guerrero). Jalisco.
1104. **fluonia** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 504, T. 95, figs. 37, 38, 39. (1900).
Sierra Madre del Sur (Guerrero). Cuenca del Río Balsas. Morelos. Jalisco.—
Tierra templada.
1105. **elissa** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 504, T. 95, figs. 40, 41 (1900).
Sierra Madre del Sur (Guerrero). Cuenca del Río Balsas.
1106. **nysa** Edw.
Can. Ent. XI. p. 191 (1877).
Sin.: similis Streck.
Mesa del Norte.
1107. **eos** (Edw.)
Hesperia eos, Trans. Amer. Ent. Soc. III. p. 276 (1871).
Sin.: comus Edw., nilus Edw., quinquemacula Skin.
Sonora. Mesa del Norte.
1108. **mate** Dyar.
Ins. Insc. Menstr. XI. p. 12 (1923).
Guerrero. (Tierra caliente de la región costera).
1109. **cassus** Edw.
Papilio III, p. 72 (1883).
Sin.: simius Wright (nec Edw.), simius Draudt (nec Edw.)
Baja California (?). Sonora.
1110. **tolteca** Scudd.
Rep. Peab. Acad. Philad. p. 76 (1872).
Tierras caliente y templada de Veracruz, Tabasco, Península de Yucatán.
En la costa del Pacífico hasta Sinaloa.
1111. **florus** (G. & S.)
Stomyles florus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 502, T. 95, fig. 24 (1900).
Sierra Madre Occidental (Nayarit).
1112. **nereus** (Edw.)
Hesperia nereus, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 207 (1876).
Sonora.

1113. **bellus** (Edw.)
Hesperia bellus, Papilio IV. p. 57 (1884).
Sonora. Sierra Madre Occidental (Durango). Montañas del Centro. Valle de México. Hasta unos 2500 metros sobre el nivel del mar.
1114. **anubis** (G. & S.)
Mastor anubis, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 568, T. 100, figs. 32, 33, 34, 35 (1900).
Sin.: perloides Ploetz, bicolor Mab.
Tierra templada de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Guerrero).
1115. **phylace** (Edw.)
Pamphila phylace, Field. & Forest. III, p. 117 (1878).
Tierra fría de las montañas del Centro. (La Malinche, Puebla).
1116. **perigenes** (G. & S.)
Mastor perigenes, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 569, T. 100, figs. 37, 38 (1900).
Sierra Madre del Sur (Guerrero). Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa. (Tierra caliente).

CALPODES Hbn.

1117. **ethlius** (Cram.)
Papilio ethlius, Pap. Exot. IV. p. 212, T. 392, figs. A. B. (1782).
Sin.: chemnis Fabr., olynthus Bdv. & Lec.
Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Tamaulipas a Tabasco). Oaxaca. Chiapas. Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero). Sierra Volcánica Transversal y Estados del Centro (hasta 2500 m)) Valle de México. Sierra Madre Occidental hasta Durango.

PANOQUINA Hem.

1118. **evadnes** (Cram.)
Papilio evadnes, Pap. Exot. T. 343, figs. G. H.
Sin.: chlorus Ploetz.
Valle de México (fide R. Mueller) (?).
1119. **pauper** (Mab.)
Proteides pauper, Pet. Nouv. Ent. p. 201 (1878).
Tierras templada y caliente de Veracruz y Tabasco.
1120. **sylvicola** (H. -S.)
Goniloba sylvicola, Corr. Blatt Regensb. XIX, p. 55 (1865).
Sin.: nero auct. (nec Fabr.)
Tierras caliente y templada de la Región del Pacífico (Guerrero, Jalisco, Colima). En la Región del Golfo en Veracruz y Tamaulipas.
1121. **nyctelius** (Latr.)
Hesperia nyctelius, Enc. Méth. IX. p. 746 (1823).
Sin.: ares Feld., aegialea Ploetz, coccinia H. -S.
Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. Sierra Madre del Sur (Guerrero, Oaxaca).—En las montañas del Centro hasta más de 2200 metros sobre el nivel del mar. Valle de México.

1122. **ocola** (Edw.)
Hesperia ocola, Proc. Ent. Soc. Philad. II. p. 20, T. 11, fig. 4 (1863).
Sin.: cornelius Draudt (nec Latr.), stratyllis Burm.
Tierras templadas de la Región del Golfo, de Tamaulipas a Tabasco. En la Región del Pacífico de Chiapas a Nayarit. Cuenca del Río Balsas.

1123. **vala** (Mab.)

Pamphila vala, C. rend. Soc. Ent. Belg. p. 176 (1891).

Sin.: actor Mab.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco.

1124. **hemizona** (Dyar.)

Prenes hemizona, Proc. U. S. Natl. Mus. 54, p. 339 (1918).

Valle de Tehuacán, Pue.

1125. **errans** (Skin.)

Pamphila errans, Ent. News III, p. 174 (1892).

Sin.: nereus Wright (nec Edw.)

Baja California.

NAEVOLUS Hem. (= CYDRUS G. & S)

1126. **naevolus** (G. & S.)

Cydrus naevolus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 153, T. 96, figs. 19, 20 (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz y Tabasco.

AIDES Billb.

1127. **elara** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 514, T. 96, figs. 25, 26 (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

THESPIEUS G. & S.

1128. **macareus** (H. -S.)

Goniloba macareus, Corr. Blatt Regensb. 23, p. 192 (1869).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Sierra Madre del Sur. Cuenca del Río Balsas. Jalisco. En las montañas del Centro hasta 2200 metros o algo más. Valle de México. Puebla.

1129. **cacajo** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus., 44, p. 280 (1913).

Tierras templada y templado-cálida de la Cuenca del Río Balsas. Morelos.

1130. **gayra** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus., 54, p. 339 (1918).

Sierra Madre del Sur (Guerrero). Cuenca del Río Balsas.

1131. **zaovinia** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 44, p. 280 (1913).

Sin.: rupilius Schs. (hembra).

Tierras templada y caliente de la Cuenca del Río Balsas. Valle de Tehuacán. Oaxaca.

1132. **dalmani** (Latr.)

Hesperia dalmani, Enc. Méth. IX. p. 747 (1823).

Tierras templado-cálida y caliente de Veracruz y Tabasco.

a. **dalmani guerreronis** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 44, p. 280 (1913).

Tierras caliente y templado-cálida de la Cuenca del Río Balsas.

VACERRA G. & S.

1133. **litana** (Hew.)

Hesperia litana, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 494 (1866).

Sin.: caprotina H. -S., socles Ploetz, aeos Ploetz, cabenta Ploetz.

Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán).

1134. **egla** (Hew.)

Hesperia egla, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 82 (1877).

Tierra caliente y templado-cálida de Veracruz.

TIRYNTHIA G. & S.

1135. **conflua** (H. S.)

Goniloba conflua, Prodr. Syst. Lepid. III. p. 73 (1869).

Tierra caliente del Sur de Veracruz.

NICONIADES Hbn.

1136. **xanthaphes** Hbn.

Exot. Schmett. T. 147 (1806).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz y Tabasco.—Colima.

1137. **caeso** (Mab.)

Proteides caeso, C. rend. Soc. Ent. Belg. p. 88 (1891).

Tierra caliente de Veracruz.

1138. **merenda** (Mab.)

Proteides merenda, Petites Nouv. Ent. II. p. 202 (1878).

Tierra caliente del Sur de Veracruz, Tabasco.

OXYNTES G. & S.

1139. **corusca** (H. S.)

Goniloba corusca, Prodr. Syst. Lep. p. 72.

Sin.: martius Mab., zisa Ploetz.

Sierra Madre del Sur (Guerrero).

THOON G. & S.

1140. **modius** (Mab.)

Proteides modius, Le Natur. p. 99, fig. 2 (1889).

Sin.: stilio Mab.

Tierra templado-cálida del Sur de Chiapas.

RINTHON G. & S.

1141. **chiriquensis** (Mab.)

Proteides chiriquensis, Le Natur. p. 127, fig. 1 (1889).

Sin.: cabella Ploetz.

Tierra templada y caliente de Veracruz, Oaxaca, Tabasco.—Valle de Tehuacán, Pue.

1142. **cynea** (Hew.)

Hesperia cynea, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 456 (1876).

Sin.: erebina Mschlr., tersa Mschlr., kasus Mschlr.

Tierras templado-cálida y caliente del Sur de Veracruz y Tabasco.

1143. **bistrigula** (H. S.)

Cobalus bistrigula, Prodr. Syst. Lep. III. p. 83. (1869).

Sin.: alus Mab., velleius Ploetz.

Tierra caliente del Sur de Veracruz.

1144. **melius** (Geyer).

Thracides melius, Zutr. Exot. Schmett. figs. 755-756, IV. p. 35.

Sin.: irma Mschlr.

Tierra caliente de la Región del Golfo (del Sur de Veracruz a Yucatán).—Sierra Madre del Sur (Guerrero).

1145. **megalops** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 533, T. 98, figs. 11, 12, 13 (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.
1146. **luctatius** Schs.
Proc. Zool. Soc. Lond. p. 361 (1913).
"México". No conozco esta especie.
1147. **zaba** Stgr.
Arch. Naturg. 86, p. 165.
No conozco esta especie.

COBALUS Hbn.

1148. **fidicula** (Hew.)
Hesperia fidicula, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, p. 81.
Sin.: hesiodes Plötz.
Tierra caliente del Sur de Veracruz.
1149. **gabina** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 535, T. 98, figs. 17, 18. (1900).
Tierra caliente de Veracruz.
1150. **percosius** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 536, T. 95, figs. 22, 23, 24 (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.
1151. **cannae** H. -S.
Prodr. Syst. Lep. III, p. 83 (1869).
Sin.: osembo Mschl.
Tierras templada y caliente de todo el Sur. Cuenca del Río Balsas. Michoacán, Jalisco. Colima. Morelos. Sur de Puebla. Veracruz.
1152. **tertianus** H. -S.
Prodr. Syst. Lepid. III, p. 83. (1869).
Sin.: warra Mschl. (macho), zola Mschl. (hembra).
Tierra caliente del Sur de Veracruz. (Presidio).

COBALOPSIS G. & S.

1153. **pelora** (Ploetz).
Hesperia pelora, Stett. Ent. Zeit. p. 344 (1882).
Sin.: autumnata Ploetz, edda Mab.
Tierra caliente de Yucatán, Campeche, Tabasco.
1154. **dyscritus** (Mab.)
Carystus dyscritus, C. rend. Soc. Ent. Belg. 35. p. 115 (1891).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco, Sur de Veracruz.

OEONUS G. & S.

1155. **pyste** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 540, T. 98, figs. 38, 39, 40, 41 (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.

MUCIA G. & S.

1156. **thya** G. & S.
Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 541, T. 92, figs. 42, 43, 44 (1900).
Tierra caliente de Veracruz, Oaxaca. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

MORYS G. & S.

1157. **valerius** (Mschl.)

Apaustus valerius, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 223 (1878).
Tierras caliente y templada de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). Sierra Madre del Sur y costa del Pacífico hasta Guerrero.

REMELLA Hem. (= PERIMELES G. & S.)

1158. **remus** (Fabr.)

Hesperia remus, Ent. Syst. Suppl. p. 434.
Sin.: justinoides Btlr., vopiscus H. -S.
Tierras caliente y templada de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán). En la Región del Pacífico de Chiapas a Colima.

TIGASIS G. & S.

1159. **zalates** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 544, T. 99, figs. 4, 5. (1900).
Tierra caliente de la costa del Pacífico. (Acapulco, Gro.)

EUTYCHIDE G. & S.

1160. **complana** (H. -S.)

Prodr. Syst. Lepid. III. p. 75.
Sin.: midia Hew., gura Ploetz, favetta Ploetz.
Tierra caliente de Veracruz, Tabasco.

1161. **ochus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 546, T. 99, figs. 14, 15, 16. (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.

1162. **lycortas** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 547, T. 99, figs. 20, 21. (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.

PHANES G. & S.

1163. **justinianus** (Latr.)

Hesperia justinianus, Enc. Méth. p. 760 (1823).
Sin.: aletes Hbn.
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco. Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero). Jalisco. Colima.

EUROTO G. & S.

1164. **lyde** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 551, T. 99, figs. 32, 33. (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

1165. **miccythus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 551, T. 99, figs. 34, 35. (1900).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Sierra Madre del Sur (Guerrero).

PHLEBODES Hbn.

1166. **tiberius** (Mschlr.)

Apaustus tiberius, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32, p. 329 (1882).
Sin.: pertinax Wats. (nec Cram.)
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

LEREMA Scudd.

1167. **accius** (A. & S.)

Papilio accius, Lep. Ins. Georgia I, p. 45, T. 23 (1797).

Sin.: *monoco* Scudd., *punctella* G. & R., *nortonii* Edw., *parumpunctata* H. -S., *pattenii* Scudd., *curtius* Scudd., *chamis* Scudd.

En todo el país, con excepción de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Hasta alturas de unos 2500 metros. (Valle de México).

MOERIS G. & S.

1168. **striga** (Hbn.)

Talides striga, Zutr. Exot. Schmett. figs. 739, 740.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

1169. **hyagnis** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 557 (1900).

Tierra caliente de Veracruz.

METRON G. & S.

1170. **chrysogastra** (Btlr.)

Pamphila chrysogastra, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 506 (1870).

Sin.: *fasciata* Mschlr., *goza* Hew., *cuneata* Ploetz, *chrysogaster*, G. & S.

Tierras templado-cálida y caliente de Veracruz. Sierra Madre del Sur (Oaxaca, Guerrero).

PAPIAS G. & S.

1171. **infuscatus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 560, T. 100, figs. 10, 11 (1900).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

1172. **dictys** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 560, T. 100, figs. 12, 13 (1900).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco.

1173. **microsema** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 561, T. 100, figs. 14, 15. (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

1174. **phainis** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 561, T. 100, fig. 16 (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.

MNASINOUS G. & S.

1175. **patage** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 562, T. 100, figs. 17, 18, 19. (1900).

Tierra templada de Veracruz.

METISCUS G. & S.

1176. **atheas** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 563, T. 100, fig. 20 (nec fig. 21). (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco y Sur de Veracruz.

MNASITHEUS G. & S.

1177. **cephis** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 566, T. 100, figs. 26, 27. (1900).

Estado de Veracruz (Misantla).

1178. **simplicissima** (H. -S.)

Pamphila simplicissima, Corr. Blatt. Regensb. p. 159 (1870).

Sin.: *nigritulus* Mab., *insignis* Ploetz, *facilis* Ploetz, *simplicissimus* G. & S.
Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

MNASILUS G. & S.

1179. **penicillatus** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 570, T. 100, figs. 39, 40, 41, 42 (1900).

Sin.: *zalma* Ploetz.

Tierra caliente de las 2 costas hasta el Sur de Veracruz y Nayarit.

VEHILIUS G. & S.

1180. **illudens** (Mab.)

Cobalus illudens, C. r. Soc. Ent. Belg. 35, p. 73 (1891).

Tierras templada y caliente de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas. Sierra Madre del Sur hasta Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima.

1181. **venosus** (Ploetz).

Apaustus venosus, Stett. Ent. Zeitg. p. 160 (1884).

Tierra caliente de Veracruz.

LERODEA Scudd.

1182. **fimbriata** (Ploetz).

Hesperia fimbriata, Stett. Ent. Zeit. 43, p. 321 (1882).

"México".—No conozco esta especie. Su clasificación en *Lerodea* es dudosa!

1183. **corticea** (Ploetz).

Exot. Schmett. 20, Hesp. T. 591.

Sin.: *epiberus* Mab.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas. Sierra Madre del Sur (hasta Guerrero), Cuenca del Río Balsas. Jalisco. Colima.

1184. **telata** (H. -S.)

Cobalus telata, Prodr. Syst. Lep. III. p. 81 (1809).

Sin.: *tyrtaeus* Ploetz.

Tierras caliente y templado-cálida de la Región del Pacífico hasta Sinaloa. En la región del Golfo de Yucatán a Veracruz.

1185. **fraus** (G. & S.)

Megistias fraus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 574, T. 101, fig. 12 (1900).

Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

1186. **edata** (Ploetz).

Exot. Schmett. XX. Hesp. T. 580.

Sin.: *isus* G. & S.

Tierras templada y caliente de todo el Sur hasta el Norte de Veracruz y Nayarit. Cuenca del Río Balsas.

1187. **labdacus** (G. & S.)

Megistias labdacus, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 573, T. 101, figs. 6, 7 (1900).

Tierras templada y caliente de la Región del Pacífico (de Chiapas a Colima). Cuenca del Río Balsas. Morelos. Veracruz.

1188. **jera** (G. & S.)

Megistias jera, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 572, T. 101, figs. 4, 5 (1900).

Sierra Madre del Sur (Guerrero), tierras templada y caliente.

1189. **tripunctata** (Latr.)

Hesperia tripunctata, Enc. Méth. IX. p. 752 (1823).

Sin.: *obsoleta* Mschl., *tripunctatus* G. & S.

Tierra caliente de Veracruz y Tabasco.

1190. **neamathla** Skin. & Wms.

Trans. Amer. Ent. Soc. 49, p. 145, fig. 33 (1923).

Mesa Central (Jalisco). Colima

1191. **eufala** (Edw.)

Hesperia eupala, Trans. Amer. Ent. Soc. II. p. 311 (1869).

Sin.: *floridae* Mab., *dispersus* Gndl., *micylla* Burm., *obscura* Mab., *nereus* Wright (nec Edw.), *dispersa* H. -S., *osyka* Edw. (hembra).

Tierras caliente y templada de toda la Región del Pacífico (de Chiapas a Sonora y Baja California). Estado de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León.

1192. **arabus** (Edw.)

Pamphila arabus, Papilio II. p. 26 (1882).

Sin.: *dysaules* G. & S.

Sierra Madre del Sur (Guerrero). Sierra Madre Occidental. Sonora.

VORATES G. & S.

1193. **decora** (H. -S.)

Cobalus decora, Prodr. Syst. Lep. III. p. 81 (1869).

Sin.: *tanaquilus* Mschl., *decorus* G. & S.

Tierra caliente de Veracruz.

VINIUS G. & S.

1194. **tryhana** (Kaye).

Padraona tryhana, Trans. Ent. Soc. London p. 581, T. 30, fig. 3 (1914).

Sin.: *sophistes* Dyar.

Tierra caliente y templado-cálida de Veracruz.

POTANTHUS Scudd.

1195. **epictetus** (Fabr.)

Hesperia epictetus, Ent. Syst. III. p. 338 (1793).

Sin.: *ferrago* Ploetz, *eudesmia* Ploetz.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

1196. **inculta** (Dyar).

Padraona inculta, Proc. U. S. Natl. Mus. 54. p. 340 (1916).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz.

CARYSTUS Hbn.

1197. **claudianus** (Latr.)

Hesperia claudianus, Enc. Méth. IX. p. 756 (1823).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

1198. **cynaxa** (Hew.)

Hesperia cynaxa, Descr. Hesp. p. 25 (1866).

Tierras templada y templado-cálida de Veracruz.

1199. **fantasos** (Cram.)

Papilio fantasos, Pap. Exot. IV. T. 300, figs. E. F.

Sin.: *abebalus* Cram., *eucherus* Ploetz.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. En la costa del Pacífico en Guerrero, Jalisco, Colima.

1200. **coryna** (Hew.)

Hesperia coryna, Trans. Ent. Soc. London. p. 494 (1866).

Sin.: *catargyra* Feld.

Tierras templada y templado-cálida de Veracruz, Tabasco.

ZENIS G. & S.

1201. **minos** (Latr.)

Hesperia minos, Enc. Méth. IX, p. 756 (1823).

Sin.: *jebus* Ploetz, *melaleuca* Ploetz.

Tierras templada y templado-cálida de Veracruz.

AECAS Hem. (= FLACCILLA G. & S.)

1202. **coatepeca** (Schs.)

Flaccilla coatepeca, Proc. U. S. Natl. Mus. 24, p. 458 (1902).

Estado de Veracruz (Coatepec).

GODMANIA Skin. & Rams.

1203. **malitiosa** (H. -S.)

Goniloba malitiosa, Corr. Blatt Regensb. p. 54 (1865).

Sin.: *lycaenoides* Ploetz.

Tierras templada y caliente de Veracruz, Chiapas (Soconusco).

1204. **silius** (Latr.)

Hesperia silius, Enc. Méth. p. 764 (1723).

Sin.: *antistia* Ploetz.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Península de Yucatán. Sierra Madre del Sur y costa de Guerrero.

1205. **syraes** (G. & S.)

Cymaenes syraes, Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 595, T. 103, figs. 1, 2, 3 (1901).

Tierras templada y caliente de la Región del Pacífico (de Chiapas a Sinaloa y Durango), Michoacán, Cuenca del Río Balsas, Sur de Puebla. Veracruz.

MNASEAS G. & S.

1206. **bicolor** (Mab.)

Thymelicus bicolor, Le Nat. p. 174, fig. 4 (1889).

Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz.

METHIONOPSIS G. & S.

1207. **ina** (Ploetz).

Hesperia ina, Exot. Schmett. XX. Hesp. T. 261.

Sin.: *modestus* G. & S., *philemon* Butl.

Tierras caliente y templada de la Región del Pacífico (Chiapas a Colima). Veracruz, Tabasco.

EUTOCUS G. & S.

1208. **phthia** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 600, T. 103, figs. 18, 19, 20 (1901).

Tierras templado-cálida y caliente de Veracruz y Tabasco.

EPRIS G. & S.

1209. **veleda** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II. p. 601, T. 103, figs. 21, 22, 23 (1901).

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

MNASICLES G. & S.

1210. **geta** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 602, T. 103, figs. 24, 25, 26 (1901).
Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

1211. **hicetaon** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 603, T. 103, fig. 27 (1901).
Estado de Veracruz. Durango (?).

CALLIMORMUS Scudd.

1212. **juventus** Scudd.

Rep. Peab. Acad. Sci. p. 74 (1872).
Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

1213. **gracilis** (Feld.)

Ancyloxypha gracilis, Reise Novara Lep. III, T. 74, fig. 28.
Sin.: alsimo Ploetz.
Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz y Tabasco.

1214. **corades** (Feld.)

Ancyloxypha corades, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 477 (1862).
Sin.: decrepida H. -S., tenera Ploetz.
Tierras caliente y templada de todo el Sur. Cuenca del Río Balsas, Jalisco, Colima, Nayarit. En la Región del Golfo hasta el Norte de Veracruz.

MNESTHEUS G. & S.

1215. **cometho** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 607, T. 103, figs. 42, 43. (1901).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

EPINOSIS Schs.

1216. **angularis** (Mschl.)

Pamphila angularis, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 26, p. 335 (1876).
Sin.: atheas G. & S. 1900, T. 100, fig. 21 (nec 20).
Tierras caliente y templado-cálida de Tabasco.

CARYSTOIDES G. & S.

1217. **basoches** (Latr.)

Hesperia basoches, Enc. Méth. IX, p. 747 (1823).
Sin.: argyrocoryne Mab., basochesii Mueschl.
Colima. Tierra caliente del Sur de Veracruz.

LYCHNUCHOIDES G. & S.

1218. **fráppenda** Dyar.

Ins. Insc. Menstr. VIII, p. 187 (1920).
Valle de México.

LYCAS G. & S.

1219. **argentea** (Hew.)

Hesperia argentea, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, p. 487 (1866).
Sin.: argenteus G. & S.
Sierra Madre del Sur (Guerrero).

ORSES G. & S.

1220. **cynisca** (Swains.)

Hesperia cynisca, Zool. Ill. I. T. 40.
 Sin.: *catina* Hew., *povas* Reak.
 Tierras caliente y templada de Veracruz.

THRACIDES Hbn.

1221. **phidon** (Cram.)

Papilio phidon, Pap. Exot. III. T. 245, figs. F. G.
 Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz, Tabasco y Sur de Chiapas (Soconusco).

1222. **luda** (Hew.)

Hesperia luda, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 80 (1877).
 Sin.: *hundurensis* Mab., *nealus* Ploetz.
 Tierra caliente del Sur de Veracruz (Presidio).

1223. **molion** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 625. T. 105, figs. 16, 17, 18. (1901).
 Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz, Tabasco.

1224. **uridon** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 42, p. 43 (1912).
 Sierra Madre del Sur (Guerrero).

1225. **salius** (Cram.)

Papilio salius, Pap. Exot. I, T. 68, fig. E.
 Sin.: *antoninus* Latr.
 Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero). Península de Yucatán.
 Tierra caliente del Sur de Veracruz y Tabasco.

1226. **longirostris** (Sepp.)

Papilio longirostris, Surin. Vlind. T. 27.
 Sin.: *telegonus* Hbn.
 Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco. Sierra Madre del Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero). Jalisco, Colima.

1227. **xanthura** G. & S.

Biol. Centr. Amer. Rhop. II, p. 630, T. 105, figs. 12, 13 (1901).
 Tierras caliente y templado-cálida del Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche.

PERICHARES Scudd.

1228. **coridon** (Fabr.)

Papilio coridon, Syst. Ent. p. 533 (1775).
 Sin.: *phocion* Fabr., *dolores* Reak., *adela* Hew., *marmorata* Scudd., *corydon* Wats.
 Tierras templada y caliente de la Región del Golfo (de Veracruz a Yucatán).
 En la Región del Pacífico de Chiapas a Colima.

1229. **lotus** (Btlr.)

Telegonus lotus, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 195 (1870).
 Tierras templada y caliente de Veracruz, Tabasco, Sur de Chiapas (Soconusco). Excepcionalmente se ha encontrado en el Valle de México.

TALIDES Hbn.

1230. **sergestus** (Clerck).

Papilio sergestus, Icon. Ins. T. 42, fig. 2.

Sin.: *sinon* Cram.

Tierras caliente y templado-cálida de Veracruz, Tabasco, Chiapas.

Familia MEGATHYMIDAE

AEGIALE Feld.

1231. **hesperiaris** (Wlk.)

Castnia hesperiaris, List. Lep. Het. Br. Mus. VII, p. 1583. (1856).

Sin.: *kollari* Feld., *agavis* Blázquez.

Tierra fría de la Mesa Central. Puebla, Michoacán, Jalisco, Durango. Sierra Volcánica Transversal. Valle de México.

MEGATHYMUS Scudd.

1232. **yuccae** (Bsd. & Lec.)

α. **yuccae navajo** Skin.

Ent. News, XXII, p. 300 (1911).

Baja California, Sonora, Chihuahua.

1233. **streckeri** (Skin.)

α. **streckeri texana** B. & McD.

Contr. Nat. Hist. Lep. I. p. 39, T. 2, fig. 9 (1912).

Mesa del Norte.

1234. **neumoegeni** Edw.

Papilio II, p. 27 (1882).

Mesa del Norte. Mesa Central. Sierra Volcánica Transversal. Valle de México.

α. **neumoegeni stephensi** Skin.

Ent. News, XXIII, p. 126 (1912).

Sin.: *neumoegeni* Wright (nec Edw.)

Baja California. Sonora.

1235. **mejicanus** Bell.

Amer. Mus. Novit. N° 1013, p. 8, figs. 5, 6 (1938).

Estado de Durango. (Tierra fría).

1236. **polingi** Skin.

Ent. News XVI, p. 232 (1905).

Sonora.

1237. **mariae** B. & B.

Contrib. Nat. Hist. Lep. V. p. 100 (1924).

Chihuahua.

1238. **smithi** Drc.

Biol. Centr. Amer. Het. II, p. 320, T. 69, fig. 5 (1896).

Sierra Madre del Sur (Guerrero). Cuenca del Río Balsas. Mesa Central. Valle de México. Nuevo León.

1239. **indecisa** (Btlr. & Drc.)

Aegiale indecisa, Cist. Ent. I. p. 116 (1872).

Chiapas.

1240. **rheton** Dyar.

Proc. U. S. Natl. Mus. 44, p. 282 (1913).

Sierra Madre del Sur (Guerrero), Jalisco, Colima, Nayarit.

LISTA ALFABETICA

DE LOS

HESPERIOIDEA

	Nos.:		Nos.:
abebalus Cram.	1119	alpheus Edw.	1000
accius A. & S.	1167	alsimo Ploetz.	1213
Achalarus Scudd.	893-898	alus Mab.	1143
Achlyodes Hbn.	976-978	amaryllis Stdg.	920
aconita Ploetz.	989	ambigua M. & B.	792
actor Mab.	1123	ambla Ploetz.	925
adamas Ploetz.	921	Amblyscirtes Scudd.	1100-1116
adela Reak.	1228	amisus Hew.	809
adjutrix Ploetz.	988a.	amphion Geyer.	859
Adopaeoides G. & S.	1050	amphissa Ploetz.	1063
adusta Ploetz.	993	amphyx Mab.	853
advena Mab.	877	ampyx G. & S.	853
aea Dyar.	1036	amra Hew.	794
Aecas Hem.	1202	amyntas Fabr.	839
Aegiale Feld.	1231	amystis Hew.	798
aegialea Ploetz.	1121	anacreon Ploetz.	891
aegides H. -S.	981	anacreon Stdg.	958
aeos Ploetz.	1133	ananius Ploetz.	880
Aethilla Hew.	878-879	anaphides Mab. & B.	848
affinis H. -S.	793	anaphus Cram.	848
afranius Lintn.	1028	anastomosis Mab.	969
agathokles Ehrm.	861	Anastrus Hbn.	968
agavis Blázquez.	1231	ancora Ploetz.	1058
agricola Bsd.	1070	Ancyloxypha Feld.	1051
agricola Drdt.	1039	angularis Moeschl.	1216
agricola Ploetz.	1069	anicius G. & S.	924
agricola Wright.	1069	Anisochoria Mab.	981-982
Aguna Williams.	822-825	anomala Mab.	1037
Aides Billb.	1127	antaeus Draudt.	825
alana Reak.	993	anticus Ploetz.	972
alardus Stoll.	849	Antigonus Hbn.	948-954
alba Edw.	990	antiope Ploetz.	859
albescens Ploetz.	988a.	antistia Ploetz.	1204
albiciliata Roeb.	802	antonius Latr.	1225
albicilla H. -S.	802	anubis G. & S.	1114
albicuspis G. & S.	904	apastus Cram.	856
albicuspis Shepard.	814	aphractoa Dyar.	1081
albifasciatus Rbr.	842	aplica Bell.	1008
albimedia Draudt.	954	Apyrothrix Linds.	789-791
albiastris Ploetz.	823	arabus Edw.	1192
albiciliata G. & S.	896	araxes Hew.	789
albiciliata G. & S.	894	arene Edw.	1051
albiciliatus Dyar.	895	ares Feld.	1121
albiciliatus Mab.	894	argentea Hew.	1219
albofasciatus Hew.	826	argenteus G. & S.	1219
albomarginatus G. & S.	1035	Argopteron Wts.	1045
albovittata Gte.	988	argyrocoryne Mab.	1217
alcaeus Hew.	834	arizonae G. & S.	789a.
alciphron G. & S.	817	arizonensis Mab. & B.	1000
aletes Hbn.	1163	arizonensis Skin. (Codatractus).	833
alladius G. & S.	901	arizonensis Skin. (Polygonus).	839

	Nos.:		Nos.:
arsaces Mab.	825	brettus Holl.	1058
arsalte L.	994	brettus Wgt.	1058
Arteurotia Btlr. & Drc.	907	brevicauda Ploetz.	841
asander Hew.	825	briccus Drdt.	856
ascalaphus Stdg.	1002	briccus Wms.	856
asine Hew.	818	bromias G. & S.	912
astylos Cr.	869	brontes F.	862
Astraptes Hbn.	840-856	brunnea Mab. & B.	937
asychis Cr.	1022	brunnea Scudd.	1040
Atalopedes Scudd.	1063	bryaxis Hew.	830
Atarnes G. & S.	931	bubaris G. & S.	943
atheas G. & S.	1176	bubobon Dyar.	1044
atheas G. & S. (Sin.)	1216	bucephalus Steph.	1058
athenion Hbn.	1066	Bungalotis Wts.	869-870
athymnios Mschl.	879	busiris Hbn.	976
Atrytone Scudd.	1085-1095	busirus Cr.	976
Atrytonopsis G. & S.	1096-1099	Eutleria Kirby.	1036-1044
augias Hbn.	1058	Cabares Godm. & Salv.	899-900
auginulus G. & S.	816a.	cabella Ploetz.	1141
auginus G. & S.	820	cabenta Ploetz.	1133
auginus Hew.	816	cacajo Dyar.	1129
aulestes Cr.	845	caelus Wts.	824
aulus Drdt.	844	caepio H. -S.	876
aunus Fabr.	862	caeso Mab.	1137
aurantiaca G. & S.	1053	Caicella Hem.	885-887
aurantiaca Hew.	1052	caicus H. -S.	885
aurocapilla Stgr.	1020	caieta Mab. & B.	889
aurunce Hew.	824	cajeta H. -S.	889
ausonius Latr.	840	calafia Wms.	809a.
australis Mab.	1034	calanus G. & S.	902
Autochton Hbn.	861-868	calathana Hew.	902
autumna Ploetz.	1153	calavius G. & S.	942
auxo Mschl.	961	calavius Mab.	902
aventinus G. & S.	886	calchas H. -S.	891
avitus Cr.	857	calenus Mab.	815
axius Ploetz.	1056	calidius G. & S.	964
azteca Scudd.	1004	california Wgt.	1061
aztecus G. & S.	1004	californica Mab.	1095
azul Reak.	842	californica Smith.	835
basoches Latr.	1217	caliginea G. & S.	941
basochesii Mschl.	1217	callidus Skin. & Wlls.	1024
bathyllus Harris.	881	Callimormus Scudd.	1212-1214
belti G. & S.	799	callipetes G. & S.	965
belus G. & S.	805	calpio Kaye.	876
bellus Edw.	1113	Calpodes Hbn.	1117
bicolor Mab. (Amblyscirtes).	1114	campestris Bsd.	1063
bicolor Mab. (Mnaseas).	1206	Camptopleura Mab.	961-962
bifascia H. -S.	851	candida Wgt.	1052
bilinea Mab.	908	canescens Feld.	966
bipuncta Ploetz.	983	cannae H. -S.	1151
bipunctatus Gmel.	863	caprotina H. -S.	1133
bistor Dyar.	1013	capys G. & S.	865
bistriata G. & S.	1050	carin Hbn.	1058
bistrigula	1143	Carrhenes G. & S.	963-966
blanda Ploetz.	1027	carus Edw.	1057
bocus Ploetz.	861	Carystoides G. & S.	1217
borja Ehrm.	812	Carystus Hbn.	1197-1200
brettoides Wgt.	1058	casica H. -S.	898

Nos.:

Nos.:

<i>cassus</i> Edw.	1109	<i>Cogia</i> Btlr.	888-892
<i>castolus</i> Hew.	911	<i>colon</i> Fabr.	1058
<i>catachorma</i> Dyar.	1102	<i>colorado</i> Scudd.	1059
<i>catargyra</i> Feld.	1200	<i>columbia</i> Scudd.	1061
<i>catina</i> Hew.	1220	<i>combinata</i> Ploetz.	1065
<i>catullus</i> Fabr.	996	<i>comeitho</i> G. & S.	1215
<i>ceculus</i> H. -S.	820	<i>communis</i> Grote.	988
<i>Celaenorrhinus</i> Hbn.	973-975	<i>complanata</i> H. -S.	1160
<i>cellus</i> Bsd. & Lec.	867	<i>compressa</i> Mschl.	859
<i>Celotes</i> G. & S.	995	<i>comus</i> Edw.	1107
<i>centaureae</i> Comst.	988	<i>conflua</i> H. -S.	1135
<i>ceos</i> Edw.	1021	<i>confusa</i> Staudg.	800
<i>cephis</i> G. & S.	1177	<i>consus</i> G. & S.	854
<i>ceracates</i> Hew.	1038	<i>contubernalis</i> Mab.	923
<i>cerberus</i> Hbn.	922	<i>Copaecodes</i> Speyer.	1052-1053
<i>cerealis</i> Btlr.	922	<i>corades</i> Feld.	1214
<i>cerialis</i> Cr.	922	<i>corbulo</i> Linds.	968
<i>cephisus</i> Hew.	875	<i>corentinus</i> Ploetz.	869
<i>cepio</i> Btlr.	876	<i>coridon</i> Fabr.	1228
<i>cestus</i> Edw.	1098	<i>corinna</i> Ploetz.	908
<i>chaes</i> G. & S.	813	<i>cornelius</i> Drdt.	1122
<i>chalybea</i> Scudd.	787	<i>corrota</i> G. & S.	951
<i>chamis</i> Scudd.	1167	<i>corrosus</i> Mab.	951
<i>chemnis</i> Fabr.	1117	<i>corticea</i> Ploetz.	1183
<i>chilpancingo</i> Bell.	1010	<i>corusca</i> H. -S.	1139
<i>Chicides</i> Linds.	826-827	<i>corydon</i> Wats.	1228
<i>Chiomara</i> G. & S.	1022-1023	<i>coryna</i> Hew.	1200
<i>chiriquensis</i> Mab. (<i>Celaenorrhinus</i>).	975	<i>coscinia</i> H. -S.	1121
<i>chiriquensis</i> Mab. (<i>Rinthon</i>).	1141	<i>costimacula</i> H. -S.	913
<i>chiriquensis</i> Stgr.	850	<i>coyote</i> Skin.	895
<i>chlorus</i> Ploetz.	1118	<i>creteus</i> Cr.	852
<i>cholus</i> Ploetz.	823	<i>crida</i> Hew.	795
<i>choricus</i> Schs.	935	<i>cruentus</i> Scudd.	802
<i>chromis</i> Skinn.	1077	<i>cuneata</i> Ploetz.	1170
<i>chrysogaster</i> G. & S.	1170	<i>cupreiceps</i> Mab.	1019
<i>chrysogastra</i> Btlr.	1170	<i>curtius</i> Scudd.	1167
<i>Chrysoplectrum</i> Wts.	838	<i>Cyclosemia</i> Mab.	969-970
<i>cincta</i> Ploetz.	864	<i>cyclosticta</i> Dyar.	1039
<i>cinctus</i> G. & S.	864	<i>cyda</i> G. & S.	831
<i>citrus</i> Mab.	1055	<i>cydonia</i> Drc.	788
<i>clarus</i> Cr.	835	<i>Cydrus</i> G. & S.	1126
<i>claudianus</i> Latr.	1197	<i>cyledis</i> Dyar.	832
<i>clavicornis</i> H. -S.	836	<i>cylindus</i> G. & S.	1016
<i>clercialis</i> Burm.	1034	<i>cynaxa</i> Hew.	1198
<i>clitus</i> Edw.	1032	<i>cynea</i> Hew.	1142
<i>clitus</i> Wgt.	1034	<i>cynisca</i> Swains.	1220
<i>clonias</i> Fabr.	903	<i>cyrrillus</i> Ploetz.	789
<i>clonius</i> Cr.	903	<i>dalmanni</i> Latr.	1132
<i>clytius</i> G. & S.	999	<i>Dardarina</i> Evans.	1046
<i>cnemus</i> G. & S.	992	<i>dardaris</i> Hew.	1046
<i>coatepeca</i> Schs.	1202	<i>decemmaculata</i> Sepp.	872
<i>Cobalopsis</i> G. & S.	1153-1154	<i>decolor</i> Mab.	802
<i>Cobalus</i> Hbn.	1148-1152	<i>decora</i> H. -S.	1193
<i>cobarus</i> Mschl.	925	<i>decorus</i> G. & H.	1193
<i>coecutiens</i> H. -S.	871	<i>decrepida</i> H. -S.	1214
<i>Codatractus</i> Linds.	830-834	<i>decurtata</i> H. -S.	815
<i>coeliginea</i> Mab.	941	<i>delaware</i> Edw.	1085
<i>coelus</i> Cr.	824	<i>deva</i> Edw.	1096

	Nos.:		Nos.:
dexo Mab.	870	Eprius G. & S.	1209
dhega Mab.	861	era Dyar.	1049
Dicaeus G. & S.	947	erebina Mschl.	1142
dictys G. & S.	1172	ericetorum Bsd.	990
didia Mschl.	903	erosa G. & S.	949
dilucida Ploetz.	1022	erosus Hbn.	949
dimidiata H. -S.	908	errans Skin.	1125
dinora Drdt.	846	erratica Ploetz.	1083
dinora Ploetz.	843	erynnioides Dyar.	1051
dispersa H. -S.	1191	Erynnis Schr.	1024-1035
dispersus Gundl.	1191	erythrosticta G. & S.	790
dividuum Dyar.	1045	esmeraldus Btlr.	808
Doberes G. & S.	971	ethlius Cr.	1117
dolores Reak.	1228	etias Hew.	874
domicella Erichs.	989	eucherus Ploetz.	1199
domingo Scudd.	807	Eudamidas G. & S.	936-938
dorantes Hbn. (Sin.)	811	eudemus Mab.	855
dorantes Hbn. (Sin.)	812	eudesmia Ploetz.	1195
dorantes Stoll.	809	eufala Edw.	1191
doria Ploetz.	916	eulalia Ploetz.	992
doriscus Hew.	871	eulogius Ploetz.	1088
dorus Edw.	828	eunus Edw.	1054
doryssus Swains.	814	euphemie Ehrm.	939
druryi Latr.	1067	euphrasia Ploetz.	1051
drusus Edw.	882	euribates Cr.	874
dukolum Blake.	1076	euricles Prittw.	811
dulcinea Ploetz.	786	Euroto G. & S.	1164-1165
dyscaules G. & S.	1192	eurycles Latr.	811
Dyscophellus G. & S.	871	eusebius Ploetz.	1007
dyscritus Mab.	1154	euthymides Mab. & B.	825
Ebrietas G. & S.	957-960	Eutocus G. & S.	1208
Echelatus G. & S.	944-946	Eutychide G. & S.	1160-1162
echina Hew.	878	evadnes Cr.	1118
ecliptica Btl.	959	evathlus Mab.	875
edata Ploetz.	1186	evippe G. & S.	1009
edda Mab.	1153	exadens Davis.	836
edwardsii Barnes.	1048	exadeus Cr.	836
egla Hew.	1134	exoteria H. -S.	1100
egregius Btlr.	843	fabrici Ehrm.	849
elara G. & S.	1127	facilis Ploetz.	1178
eligius Cr.	973	fantasos Cr.	1199
elissa G. & S.	1105	fasciata Mschl.	1170
eluina G. & S.	889a.	faula G. & S.	1043
elwesi G. & S.	829	favetta Ploetz.	1160
emorsa Feld.	954	ferrago Ploetz.	1195
eniopeus G. & S.	841	festus Geyer.	867
enops G. & S.	900	fidicula Hew.	1148
enotrus Cr.	844	fimbriata Ploetz.	1182
enotrus Drdt.	842	Flaccilla G. & S.	1202
eos Edw.	1107	floridae Mab.	1191
ephora H. -S.	909	florus G. & S.	1111
epiborus Mab.	1183	fluonia G. & S.	1104
epicincia Btl.	838	folia G. & S.	1103
epictetus Fabr.	1195	francisca Ploetz.	1069
epictetus Stgr.	1076	frappenda Dyar.	1218
epigena Btlr.	898	fraus G. & S.	1185
epigona G. & S.	898	fritzgaertneri Bailey.	974
Epinosis Schs.	1216	fulgerator Walch.	842

	Nos.:		Nos.:
fulgurator Btlr. & Drc.	842	holaphegges Dyar.	1012
fulminator Sepp.	842	holophegges Drdt.	1012
fumosa Reverdin.	986	hopfferi Ploetz.	852a.
fumosus Ploetz.	934	hopfferi Stgr.	801
funerbris Feld.	950	hospita Btlr.	796
funeralis Scudd. & Burg.	1034	huancavilleas Wlls.	807
fuscescens Mab.	963	hundurensis Mab.	1222
gabina G. & S.	1149	huron Edw.	1033
gala G. & S.	1091	hyacinthinus Mab.	926
garita Drdt.	1048	hyagnis G. & S.	1169
garita G. & S.	1048	hyalophara Feld.	967
garita Reak.	1047	Hydraenomia Btlr.	904-905
gaurus Ploetz.	874	hylax Edw.	1047
gayra Dyar.	1130	Hylephila Billb.	1058
genoa Ploetz.	1064	hypozona Dyar.	1065
georgina Reak.	1022	hypozonius Ploetz.	824
gesta H. S.	1027	hyster Dyar.	821
geta G. & S.	1210	idas Cr.	837
gila Ploetz.	890	igualta Wlls. & Bell.	1006
giselus Mab.	1007	illudens Mab.	1100
gizala Mschl.	875	imbras G. & S.	1017
glaphyrus Mab.	823	imitator Mab.	796
gnetus Latr.	804	ina Ploetz.	1207
Godmania Skin. & Rams.	1203-1205	inculta Dyar.	1196
golenia Mschl.	1065	indecisa Btlr. & Drc.	1239
Gorgophone G. & S.	940	infuscatus G. & S.	1171
Gorgythion G. & S.	980	inimica Btl. & Drc.	1094
goza Hew.	1170	insignis Ploetz.	1178
gracilis Feld.	1213	integrifascia Mab.	861
Grais G. & S.	934-935	interruptus Wlls.	814
guatemalcina Ehrm.	823	invisus Btl. & Drc.	1027
guerreronis Dyar.	1132a.	irma Mschl.	1144
guilfordi Weeks.	913	isokrates Ehrm.	862
gura Ploetz.	1160	isus G. & S.	1186
gyrans Ploetz.	1037	ithrana Btlr.	915
hages G. & S.	798a.	jalapus Ploetz.	894
hala Btlr.	1058	jason Ehrm.	938
hayhurstii Edw.	1003	jebus Ploetz.	1201
hecale G. & S.	1075	Jemadia Wls.	796
hedysarum Scudd.	893	jera G. & S.	1188
Helias F.	979	jobrea Dyar.	1037
Heliopetes Billb.	990-994	jonas Feld.	788
helva Mschl.	1090	jowa Ploetz.	1085
hemizona Dyar.	1124	justinianus Latr.	1163
hemula G. & S.	955	justinoides Btlr.	1158
hephaestos Ploetz.	796	juvenalis Wgt.	1029
heras G. & S.	1074	juventus Scudd.	1212
hesiodos Ploetz.	1148	kasus Mschl.	1142
Hesperia Fabr.	1059-1062	kedema Btlr.	1063
hesperiaris Wlk.	1231	kefersteinii Ploetz.	809
hesus Ww. & Hew.	874	kiowah Reak.	1095
hewitsonius Mab.	804	kollari Feld.	1231
hewitsonius Reak.	971	labdacus G. & S.	1187
hicetaon G. & S.	1211	lacaena Hew.	947
hiera Ploetz.	973	lachesis Dyar.	960
hippalus Edw.	830	lactifera Auct.	983
hippalus Feld.	943	lactifera Btlr. & Drc.	984
histrion Rbr.	839	lacustra Wgt.	1024

	Nos.:		Nos.:
lalage G. & S.	1042	martius Mab.	1139
lassia Hew.	932	Masices G. & S.	972
latipennis Mab. & V.	811	mate Dyar.	1108
laviana Hew.	991	mazans Reak.	1002
lavochea Btlr.	879	megalops G. & S.	1145
lena Wgt.	1047	megallus Mab.	858
lemur Mschl.	982	megalurus Mab.	854
Lerema Scudd.	1167	Megathymus Scudd.	1232-1240
Lerodea Scudd.	1182-1192	mejicanus Bell.	1235
leporina Ploetz.	1051	mejicanus Reak.	997
leucites Mab.	814	melaleuca Ploetz.	1201
leucodesma Godm.	823	melander Cr.	936
leussleri Linds.	1059	melane Edw.	1082
librita Ploetz.	1075	melcheri Weeks.	914
libya Scudd.	1001	meliboea G. & S.	940
licinus G. & S.	804	melius Geyer.	1144
licisca Ploetz.	914	mella G. & S.	1086
lilea Reak.	802	mellona G. & S.	1088
lindora Btlr.	820	mephitis Hew.	846
lisetta M. & B.	796	melon G. & S.	833
litana Hew.	1133	mercatus F.	842
litus Dyar.	1014	mercurius Dyar.	1026
lividus Hbn.	839	mercurius Fabr.	837
llano Dodge.	1027	merenda Mab.	1138
locutia Hew.	992	meretrix Hew.	850
logan Edw.	1085	metacomet Harr.	1095
longipennis Ploetz.	862	Methionopsis G. & S.	1207
longirostris Sepp.	1226	Metiscus G. & S.	1176
lotus Btlr.	1229	metophis Latr.	823
loxus Westw. & Hew.	917	Metron G. & S.	1170
lucidator Sepp.	840	mexicana Drdt.	867
luctatius Schs.	1146	mexicana Feld.	971
luctucus G. & S.	945	mexicana G. & S.	997
luda Hew.	1222	mexicana H. -S.	880
lugubris Feld.	925	mexicana Wgt.	881
lumida Mschl.	1065	mexicanus G. & S. (Thorybes).	880
lunulus Ploetz.	861	mexicanus G. & S. (Doberes).	971
lupulina Ploetz.	1094	microsema G. & S.	1173
luteizona Mab.	797	microsticta Dyar.	953
lycaenoides Ploetz.	1203	microsticta G. & S.	1036
Lycas G. & S.	1219	micylla Burm.	1191
Lychnuchoides G. & S.	1218	micythus G. & S.	1165
lyciades Geyer.	893	midas Cr.	869
lycidas Abb. & Sm.	893	midia Hew.	1160
lycortas G. & S.	1162	milo Drdt.	1068
lyde G. & S.	1164	milo Edw.	1070
lyraea Hew.	969	milo Wgt.	1069
macaira Reak.	992	miltas G. & S.	819
macareus G. & S.	910	minima Edw.	1053
macareus H. -S.	1128	minos Latr.	1201
macarius H. -S.	910	misitra Ploetz.	842
mackeyi Wms.	873	mithrax Mschl.	1023
macra Ploetz.	1052	Mnaseas G. & S.	1206
maestus G. & S.	1052	Mnasicles G. & S.	1210-1211
malitiosa H. -S.	1203	Mnasilus G. & S.	1179
maneros Mab.	876	Mnasious G. & S.	1175
mariae B. & B.	1237	Mnasitheus G. & S.	1177-1178
marmorata Scudd.	1228	Mnestheus G. & S.	1215

	Nos.:		Nos.:
modestus G. & S.	1207	Noctuana Bell.	983-985
modius Mab.	1140	noctula Ploetz.	1023
Moeris G. & S.	1168-1169	nortonii Edw.	1167
molion G. & S.	1223	notabilis Streck.	995
momus Fabr.	906	nyctelius Latr.	1121
monartus Ploetz.	975	nyctineme G. & S.	911
monoco Scudd.	1166	nysa Edw.	1106
montezuma Scudd.	834	Oarisma Scudd.	1047-1049
monticola G. & S.	1092	obscura Mab.	1191
montivaga G. & S.	988a.	obscurascens Mab. & B.	929a.
montivaga Scudd.	988	obscurior Drdt.	955
montivagus Reak.	986	obscurus Btlr. & Drc.	968
morphus Cr.	872	obsoleta Mschl.	1189
morrisoni Edw.	1073	occidentalis Skin.	988a.
Morys G. & S.	1157	oceanus Edw.	992
moschus Edw.	885	Ochlodes Scudd.	1068-1075
Mucia G. & S.	1156	ochus G. & S.	1161
muelleri Drdt.	1025	ocola Edw.	1122
Mylon G. & S.	932-933	octomaculata Sepp.	815
myron G. & S.	1089	Ocyba Linds.	902
myrtis Edw.	1051	oeclydes Mab. & V.	878
mys Hbn.	1076	oeclydes Ploetz.	878
Myscelus Hbn.	798-799	Oeonus G. & S.	1155
mysie Dyar.	887	ogeechensis Scudd.	1083
Mysoria Wats.	792-794	olynthus Bdv. & Lec.	1117
mythecus G. & S.	1077	Onenses G. & S.	967
Naevolus Hem.	1126	ophia Btlr.	925
naevolus G. & S.	1126	orbiger Mab.	992
nanno Edw.	1100	orcinus Feld.	904
nanus Wats.	1052	orcus Fabr.	922
narcosius Stoll.	845	orestes Edw.	898
Nascus Wts.	872-877	oricus Edw.	1000
navajo Skin.	1232a.	orizaba Scudd.	836
neacris Mschl.	968	orontes Ploetz.	862
nealus Ploetz.	1222	Orses G. & S.	1220
neamathla Skin. & Wms.	1190	orsines G. & S.	1011
nearchus Edw.	989	osceola Lint.	1095
nearchus Latr.	948	osembo Mschl.	1151
neis Geyer.	861	osyka Edw. (Atrytone).	1095
nemorum Bsd.	1068	osyka Edw. (Lerodea).	1191
nemorum Drdt.	1070	osyris Stdg.	951
nemorum Skin.	1070	otho Abb. & Sm.	1067
nemorum Wgt.	1069	Ouleus Linds.	941-943
nereus Edw.	1112	outis Skin.	888
nereus Wgt. (Panoquina).	1125	Oxynetra Feld.	800-801
nereus Wgt. (Lerodea).	1191	Oxyntes G. & S.	1139
nero auct.	1120	ozema Butl.	937
nessus Edw.	995	ozotes Btl.	978
neumoegeni Edw.	1234	Paches G. & S.	917-918
neumoegeni Wgt.	1234a.	pacuvius G. & S.	1031
nicasius Ploetz.	810	pacuvius Lintn.	1030
nicias Fabr.	874	pahaska Leussl.	1060
Niconiades Hbn.	1136-1138	pallida Feld.	978
nigritulus Mab.	1178	pallida Rbr.	839
nigrociliata Mab. & B.	896	Panoquina Hem.	1118-1125
nilus Edw.	1107	panthius H. -S.	825
nivea Scudd.	992	Papias G. & S.	1171-1174
nivella Mab.	992	parumpunctata H. -S.	1167

	Nos.:		Nos.:
pastor Feld.	991	polyclea G. & S.	1080
patage G. & S.	1175	polyctor Prittw.	915
patrobas Hew.	796	Polygonus Hbn.	839
pattenii Scudd.	1167	polysticta Mab.	982
paucipuncta Dyar.	882	porcius Feld.	871
pauper Mab.	1119	Potanthus Scudd.	1195-1196
pausus Warr.	- 948	poterillo H. -S.	899
pelagica Weeks.	1022	potrillo Lucas.	899
Pellicia H. -S.	908-915	powesheik G. & S.	1047
pelopea G. & S.	928	poyas Reak.	1220
pelora Ploetz.	1153	praeceps Scudd.	1065
penaea Dyar.	1036	pratincola Bsd. (macho)	1068
penicillatus G. & S.	1179	pratincola Bsd. (hembra)	1069
percosius G. & S.	1150	pratincola Wright. (Sin.)	1069
perforata Mschl.	1002	pratincola Wright. (Sin.)	1070
perforata Ploetz.	909	praxis Ploetz.	923
Perichares Scudd.	1228-1229	prittwitzi Ploetz.	1050
perigenes G. & S.	1116	procne Ploetz.	812
Perimeles G. & S.	1158	procris Edw. (macho)	1052
perissodora Dyar.	799a.	procris Edw. (hembra)	1053
perlodes Ploetz.	1114	proptertius Scudd. & Burg.	1029
perniciosum G. & S.	838	Proteides Hbn.	835-837
perniciosus H. -S.	838	proteoides Ploetz.	807
pertinax Wats.	1166	proteus Hbn.	809
phainis G. & S.	1174	proteus L.	807
phalaeus G. & S.	847	protillus H. -S.	809
phalaenoides Hbn.	979	proxenus G. & S.	919
Phanes G. & S.	1163	proxima M. & B.	792
Phanus Hbn.	906	psaumis G. & S.	1084
phareus Panzer.	1058	Pseudocopaesodes Skin. & Wms.	1054
phasias Hew.	860	pseudocellus Cool. & Clem.	868
phassias Mab.	860	pseudognetus Mab.	796
pherenice Hew.	872	pulcherius Feld.	933
phidon Cram.	1221	pulverulenta Feld.	952
phidyle G. & S.	970	punctella G. & R.	1167
philemon Butl.	1207	pustula Geyer.	1067
philetas Edw.	987	puzillius Mab.	1078
Phlebodes Hbn.	1166	pygmalion H. -S.	804
Phocides Hbn.	802-806	pylades Scudd.	881
phocion Fabr.	1228	pyralina Mschl.	980
phocus Cram.	872	Pyrgus Hbn.	986-989
Pholisora Scudd.	- 996-1021	Pyrrhopyge Hbn.	785-788
phthia G. & S.	1208	pyste G. & S.	1155
phylace Edw.	1115	python Edw.	1097
phylaeus Dru.	1058	Pythonides Hbn.	919-920
pialia Hew.	803	quadratum Sepp.	869
pigmallon Cr.	804	quadratus Dyar.	1004
pilatus Ploetz.	812	Quadrus Linds.	922-929
pittacus Edw.	1099	quinquemacula Skin.	1107
plancartei C. C. Hoffm.	791	radiatus Ploetz.	995
plummertini Weeks.	1002	rauterbergi Skinn.	809
Poanes Scudd.	1079-1081	rayata B. & McD.	1053
Poanopsis G. & S.	1078	reflexus Mab. & Blitt.	861
pocahontas Holl.	1083	Remella Hem.	1158
polingii Barnes.	1041	remus Fabr.	1158
polingi Skin.	1236	rhesus Edw.	1056
Polites Scudd.	1064-1066	rheton Dyar.	1240
polla Mab.	918	rhetus F.	869

Nos.:

Nos.:

rhaxenor G. & S.	1079	streckeri Skin.	1233
ribbei Stgr.	907	stephensi Skin.	1234a.
Rinthon G. & S.	1141-1147	stigma Skin.	1065
robigus Ploetz.	945	stigmaticus Mab.	934
rogersi Kaye.	798a.	stilio Mab.	1140
rubescens Moeschl.	909	striga Hbn.	1168
rupilius Schs. (hembra).	1131	subapicatus Schs.	1015
ruptifasciata Ploetz.	956	subreticulata Ploetz.	1056
ruptifasciatus G. & S.	956	sumadue Lucas.	840
rurea Edw.	1095	sumichrasti Scudd.	810
uricola Bdv.	1095	sylvanoides Bsd. (hembra)	1063
sabuleti Bsd.	1064	sylvanoides Bsd.	1069
salius Cram.	1225	sylvanoides Scudd.	1061
sallaei G. & S.	931	sylvicola H. -S.	1120
salléi Feld.	931	syraces G. & S.	1205
salvianus Fabr.	939	syrictus Fabr.	986
samenta Dyar.	1072	taeniatus Ploetz.	952
sandace G. & S.	930	Talides Hbn.	1230
sanguinea Scudd.	802	talus Cram.	840
Sarbia Wats.	797	tamenund Edw.	977
sataspes Feld.	948	tanaquilus Moeschl.	1193
savigny Latr.	839	tattus Edw.	1033
schaefferi Ploetz.	885	tehuacana Drdt.	897
scintillans Mab.	921	telata H. -S.	1184
scudderi Skinn.	1031	Telegonus Hbn.	840-856
scybis G. & S.	927	telegonus Hbn.	1226
scylla Men.	786	Telemiades Hbn.	857-860
sebalus F.	976	teleus Hbn. (Sin.)	811
sebalus Ww. & Hew.	871	teleus Hbn. (Sin.)	812
semihyalina Feld.	800	tenera Ploetz.	1214
semitincta Dyar.	1005	tersa Moeschl.	1142
sempiternus Btl. & Dr.	946	terranea Butl.	891
sephara Hew.	925	tertianus H. -S.	1152
sergestus Clerck.	1230	tessellata Scudd.	988
sericus Ploetz.	951	texana B. & McD.	1233
servius Ploetz.	926	texana Scudd.	806
sethos Mab.	1090	thedeia Dyar.	884
silius Latr.	1204	theramenes Mab.	961
similis Streck.	1103	Thespis G. & S.	1128-1132
simius Drdt.	1109	thiemei Ehrm.	812
simius Wright.	1109	Thoon G. & S.	1140
simplex Feld.	1050	Thorybes Scudd.	880-884
simplicissima H. -S.	1178	thrasibulus Fabr.	962
simplicissimus G. & S.	1178	Thracides Hbn.	1221-1227
simplicius Stoll.	812	thraso Hbn.	977
singularis Ploetz.	1052	thrasylbulus Latr.	962
sinon Cram.	1230	thya G. & S.	1156
smithi Dr.	1238	thyestes G. & S.	914
smodora Dyar.	998	tiberius Mschl.	1166
snowi Edw.	1071	tibullus Scudd. & Burg.	1029
sobrinus G. & S.	972a.	Tigasis G. & S.	1159
socius Butl. & Dr.	802	Timochares G. & S.	955-956
socles Ploetz.	1133	Timochreon G. & S.	916
sophistes Dyar.	1194	tiphys G. & S.	909
Sostrata G. & S.	921	Tirynhia G. & S.	1135
Spathilepia Btlr.	903	tityrus Fabr.	835
stator G. & S.	985	tityrus var. Latr.	836
stratyllis Burm.	1122	tolteca Scudd.	1110

	Nos.:		Nos.:
torones Hbn.	809	viridis Edw.	1062
tortricinus Ploetz.	958	vitellina H. -S.	1082
toxews Ploetz.	896	viterboana Ehrm.	807
tractipennis Btlr. & Drc.	907	vitreus Cram.	906
trifasciata Hew.	955	vitreus Scudd.	818
trifasciatus G. & S.	955	vopiscus H. -S.	1158
tripunctata Latr.	1189	Vorates G. & S.	1193
tripunctatus G. & S.	1189	vulgata Mschl.	1020
tristis Boisd.	1033	waco Edw.	1052
tristis Stdg.	1035	Wallengrenia Berg.	1067
tristis Wright.	1029	warra Moeschl. (macho).	1152
truncata Hew.	929	westermanni Latr.	949
tryhana Kaye.	1194	weymeri Ploetz.	850
tryxus Cram.	939	willi Ploetz.	989
tutolia Dyar.	1101	williamsi Linds.	1060
Typhedanus Btlr.	901	wrightii Edw.	1054
tyrtaeus Ploetz.	1184	xanthaphes Hbn.	1136
ulixes Ploetz.	796	xanthopolys Dyar.	1087
ulphila Ploetz.	1093	xanthura G. & S.	1227
ulyxes M. & B.	796	Xenophanes G. & S.	939
undulatus Hew.	810	Yanguna Wts.	795
undulatus Ploetz.	958	yreka Edw.	1070
unifascia Mab.	1018	yuccae Bsd. & Lec.	1232
urania Ww. & Hew.	806	Yvretta Hem.	1055-1057
Urbanus Hbn.	807-821	zaba Stgr.	1147
uridon Dyar.	1224	zabulon Bsd. & Lec.	1083
ustus Hbn.	948	zagorus Ploetz.	811
uvydxia Dyar.	883	zalanthus Ploetz.	811
Vacerra G. & S.	1133-1134	zalates G. & S.	1159
vala Mab.	1123	zalma Ploetz.	1179
valeria Draudt.	892	zampa Edw.	952
valeriana Ploetz.	892	zaovinia Dyar.	1131
valerius Godm.	892	zarex Hbn.	862
valerius Moeschl.	1157	Zariaspes G. & S.	1076-1077
variegatus G. & S.	974	zelotes Hew.	905
varius Mab.	944	zenckei Ploetz.	1065
varus Ploetz.	988a.	Zenis G. & S.	1201
vectilucis Btlr.	865	zenodorus G. & S.	785
Vehilius G. & S.	1180-1181	zereda Hew.	787
veleda G. & S.	1209	Zestusa Linds.	828-829
velleius Ploetz.	1143	zethos Ploetz.	859
venezuelae Scudd.	792	zilpa Butl.	827
venosus Ploetz.	1181	zilpha Skin.	827
verus Edw.	1070	zisa Ploetz.	1139
vestris Bdv.	1095	zola Moeschl. (hembra).	1152
vibex Geyer.	1065	Zopyrion G. & S.	930
Vinius G. & S.	1194		