

ALGUNOS ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA REGION DE HUAJUAPAN DE LEON, OAX.

Por RAFAEL MARTIN DEL CAMPO,
del Instituto de Biología.

El año de 1937 planeó la Universidad Nacional de México una serie de investigaciones en la Región Mixteca, que habrían de iniciarse en el Distrito de Huajuapán de León. Durante la segunda semana de septiembre salió una comisión del Instituto de Biología para hacer un reconocimiento general y establecer un centro de trabajo, dejando desde luego un colector que comenzara a concentrar material. Por causas ajenas a nuestra voluntad fueron suspendidos los trabajos antes de finalizar el mes de septiembre, de modo que las actividades del colector duraron aproximadamente dos semanas (11 a 27 de septiembre).

La colección que se detalla en esta nota, y que comprende únicamente los vertebrados, fué hecha por nuestro buen amigo el extinto Pablo Roveglia y por el autor, fundamentalmente en Huajuapán y sus alrededores (La Hacienda, Las Campanas y Santa María); pero también se obtuvieron especímenes en el trayecto de Tehuacán, Pue., a Huajuapán (Magdalena de Alquizapán, San Antonio Zamarrilla, San Martín Atexcal, Tonahuixtla, Petlalcingo y Tlacotepec, en el Estado de Puebla). El punto más lejano alcanzado por nuestra expedición fué Tamazulapa, Oax.

Algunas de las localidades señaladas en esta nota son citadas por primera vez en el área de dispersión de ciertas especies.

Es interesante la nomenclatura vulgar de las aves en la región comenzada a estudiar; el señor Roveglia obtuvo algunos nombres vernáculos (especialmente los mixtecos) no registrados todavía en las sinonimias vulgares-científicas de las especies.

LISTA SISTEMÁTICA

Pelobatidae.

Scaphiopus hammondii multiplicatus (Cope).

Entre Petlalcingo y Tlacotepec.

Bufoidae.

Bufo simus Schmidt.

Tehuacán; Huajuapán.

Ranidae.

Rana pipiens Schreber.

Entre Magdalena de Alquizapan y San Martín Atexcal; Huajuapán.

Iguanidae.

Sceloporus horridus horridus Wiegmann.

Huajuapán; Las Campanas; La Hacienda; Tamazulapa.

Sceloporus mucronatus omiltemanus Günther.

San Antonio Zamarrilla; Tamazulapa.

Ctenosaura pectinata (Wiegmann).—Iguana.

Tonahuixtla.

Teiidae.

Cnemidophorus sexlineatus gularis (Baird y Girard).—Cuije.

Huajuapán.

Colubridae.

Masticophis mentovarius (Duméril y Bibron).

Huajuapán.

Kinosternidae.

Kinosternon integrum Le Conte.

San Martín Atexcal.

Columbidae.

Zenaidura macroura marginella (Woodhouse).—Güila.

1 h. Huajuapán.

Scardafella inca (Lesson).—Chicuquita, Lucu.

2 h. Huajuapán.

Momotidae.

Momotus mexicanus mexicanus Swainson.—Turco, Lamasú.

1 m. Santa María.

Trochilidae.

Amazilis violiceps violiceps (Gould).—Chupamirto, Dilloo.

2 m. y 3 h. Huajuapán; Santa María.

Phaeoptila sordida (Gould).—Chupamirto, Dilloo.

3 m. y 1 h. Huajuapán.

Archilochus colubris (L.).—Chupamirto, Dilloo.

1 m. y 1 h. Huajuapán.

Cuculidae.

Coccyzus americanus americanus (L.).—Cuclillo, Chiquii.

4 m. Huajuapán.

Uno de los especímenes difiere de los otros tres en el color de la mandíbula, que es gris apizarrado pálido con una pequeña mancha amarillo rojiza en las ramas mandibulares, cerca del comienzo del gonys; los demás caracteres concuerdan perfectamente con los de esta forma.

Coccyzus erythrophthalmus (Wilson).—Cuclillo, Chiquii.

1 m. y 1 h. La Hacienda.

Piaya cayana mexicana (Swainson).—Vaquero.

1 h. La Hacienda.

Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson.—Garrapatero, Lathicuinthí.

1 h. Huajuapán.

Picidae.

Centurus hypopolius (Wagler).—Carpintero, Diyitaca.

1 m. Tamazulapa.

Tyrannidae.

Sayornis nigricans nigricans (Swainson).—Mosquero.

1 m. Huajuapán.

Pyrocephalus rubinus mexicanus Sclater.—San Gabrielito, Lashshinica.

2 m. y 1 h. Huajuapán.

Tyrannus vociferans vociferans Swainson.—Abejero.

1 m. Huajuapán.

Tyrannus crassirostris crassirostris Swainson.—Colmenero.

1 h. Huajuapán.

Megarhynchus pitangua mexicanus (Lafresnaye).—Chico, Shatia.

1 m. Huajuapán.

Troglodytidae.

Heleodytes jocosus jocosus (Sclater).—Chihuahua, Lasimí.

1 m. y 1 h. Huajuapán; La Hacienda.

Mimidae.

Toxostoma curvirostre curvirostre (Swainson).—Cuicui, Lavinyá.

1 m. y 1 h. Huajuapán.

Aun cuando por su coloración los dos especímenes disponibles son típicos de esta subespecie, no lo son por todas sus medidas pues, como puede verse en la relación de ellas, el tamaño de la cola (tanto en el macho como en la hembra), excede del mayor que se admite para **T. c. curvirostre** y corresponde al de **T. c. occidentale**; en cambio, las dimensiones del tarso de la hembra son exiguas, sólo comparables a las del tarso de algunos machos de **T. c. palmeri**. (Las medidas son en milímetros. En primer término se dan las del macho). Long. total 260, 260; ala 110, 109; cola, 118, 123; culmen 30.5, 27.5; tarso 32, 30; dedo medio 25, 24.5.

Melanotis caerulescens caerulescens (Swainson).—Primavera negra.

1 m. Huajuapán.

Sylviidae.

Poliptila caerulea mexicana (Bonaparte).—Periíta.

2 m. Huajuapán; La Hacienda.

Vireonidae.

Vireo bellii bellii Audubon.—Mosquerito.

1 m. Huajuapán.

Laniidae.

Lanius ludovicianus mexicanus Brehm.—Tachi cabezón.

2 m. Huajuapán.

Mniotiltidae.

Vermivora ruficapilla ruficapilla (Wilson).—Canarito.

1 h. Huajuapán.

Dendroica aestiva aestiva Gmelin.—Esmeraldita, Laapí.

2 m. y 1 h. Huajuapán.

Dendroica nigrescens (Townsend).—Verdín.

2 m y 1 h. (todos jóvenes). Huajuapán; Santa María.

Wilsonia pusilla pileolata (Pallas).—Pipía, Laacua.

1 m. y 2 h. Huajuapán.

Icteridae.

Icterus cucullatus cucullatus Swainson.—Calandria.

1 m. La Hacienda.

Agelaius phoeniceus gubernator (Wagler).—Tordo capitán, Diirí.

1 m. Huajuapán.

Fringillidæ.

Spinus psaltria psaltria (Say).—Dominiquito.

1 m. y 1 h. Huajuapán.

Carpodacus mexicanus roseipectus Sharpe.—Gorrión.

2 h. Huajuapán.

Esta subespecie, aunque dudosa en opinión de algunos ornitólogos, no ha sido aún desechada. Y como según parece no se conocían las hembras (y los dos especímenes de nuestra colección lo son), doy en seguida sus medidas por el interés que pudieran tener en la aceptación o el rechazamiento de esta forma: longitud total, 143 y 145; ala, 76 y 75.5; cola, 63 y 62.5; culmen, 10 y 10; altura del pico en su base, 8 y 8; tarso, 18 y 18; dedo medio, 15 y 15. (Medidas en milímetros).

Chondestes grammacus strigatus Swainson.—Chindiquito.

1 h. Huajuapán.

Spizella passerina mexicana Nelson.—Llanerito.

1 ejemplar inmaduro, de sexo no determinado por el colector. Huajuapán.

Fipilo rutilus (Lichtenstein).—Chorriente.

2 m. Huajuapán.

Los dos ejemplares citados no concuerdan exactamente con la descripción del colorido de la especie, sino que la garganta y la región malar, en vez de ser blancas, presentan un tinte amarillo claro muy tenue; el vientre tiene una banda de igual color que lo recorre longitudinalmente en la línea media.

APENDICE

De ciertas aves no se obtuvieron especímenes para la colección, pero sí los nombres vernáculos locales, que son los siguientes:

Cunio	—	Geococcyx affinis
Chia	—	Cerchneis sparveria
Lonchi	—	Catharistes atratus
Ñacu	—	Asturina plagiata
Shi	—	Turdus migratorius
Tishicumí	—	Hirundo erythrogastra
Tísico	—	Polyborus cheriway.